herpy

VARANER

Blåplettet trævaran

Varanus macraei

Varanus macraei er en slank trævaran med gribehale og et mønster af blå øjepletter på sort bund. Den lever kun på øen Batanta i Indonesien, er truet i naturen og kræver et højt, varmt og fugtigt terrarie, levende insekter og en erfaren holder.

Familie: Varanidae Engelsk: Blue Tree Monitor Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**80-110 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**150-530 g**
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 80 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**29-32 °C**
Hotspot	**38-40 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-26 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-7 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**150-240 dage** ved 28,5-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr, så dyr, der indføres eller handles på tværs af grænser, skal have de tilhørende dokumenter. Arten er ikke blandt de fem varaner, der er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og for den gælder de almindelige regler. IUCN regner arten for truet (EN).

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Varanus macraei* er en trævaran, og terrariet skal derfor først og fremmest være højt. Til ét voksent dyr er mindstemålet 120 x 80 x 150 cm (længde x bredde x højde), og mere er bedre.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet holdes på 29-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden holdes på 70-90 % med daglig sprøjtning, helst morgen og eftermiddag.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB hele dagen. Brug fx to lysstofrør (omkring 54 W) og to varmelamper på 100 W, som også giver UV-lys, eller et UVB-rør kombineret med en UV-varmelampe.
FODER	*Varanus macraei* spiser levende insekter: græshopper, fårekyllinger, kakerlakker (fx *Blaptica dubia*), meldorme og superorme, af og til regnorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv, genert og nervøs. Nye dyr gemmer sig eller flygter ved berøring og kan ramle ind i ruderne. Hunner er mere ængstelige end hanner. Dyret skal ikke tvinges til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien.