herpy

VARANER

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus er en middelstor, gul varan fra Sula-øerne i Indonesien. Voksne dyr er stærkt gule, og ungerne er sorte med gule pletter. Arten kræver et stort terrarie med bassin og meget varme solpladser, lever af insekter og hvirveldyr og er truet i naturen, så den passer kun til en erfaren holder.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-130 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 120 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-33 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**24-26 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel** dybde 80 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-12 æg**
Inkubation	**164-171 dage** ved 28-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står som alle varaner, der ikke er strengere listet, på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb og salg kræver dokumentation for lovlig oprindelse (CITES-papirer eller EU-dokumenter). Den er ikke blandt de fem varaner, som private ikke må holde i Danmark ifølge bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015, og de almindelige regler for dyrehold gælder derfor.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr skal have mindst 300 × 120 × 150 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Et par skal have omkring 400 × 100 × 150 cm, som kan deles i to lige store halvdele, så dyrene kan adskilles.

TEMPERATUR
Baggrundstemperaturen i terrariet er 26-33 °C om dagen, og solpladsen under varmelamperne skal nå 40-45 °C målt som overfladetemperatur med et IR-termometer.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være høj, omkring 60-80 % som hos beslægtede arter i den gruppe, der omfatter *V. indicus*. Sprøjt ungerne dagligt med regnvand; bassinet bidrager også til fugten.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig meget. Giv UVB fra lysrør eller varmelamper med UVB, så dyret kan vælge sin dosis (Ferguson-zone 3).

FODER
Arten er kødæder. Voksne dyr får hvirveldyr (mus, fisk eller kyllingekød) en gang om ugen og insekter, især græshopper og fårekyllinger, ind imellem.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Voksne dyr af denne størrelse har tænder og kløer, der kan give dybe sår, og halen er sammentrykt og kan bruges til at slå. Hvor kraftigt bid og halesmæld er hos netop denne art, er ikke dokumenteret.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indonesien.