herpy

VARANER

Large-scaled water monitor

Varanus nuchalis

Varanus nuchalis er en stor, kraftig vandvaran fra de centrale Visayas-øer i Filippinerne, tidligere regnet som underart af *Varanus salvator*. Den kendes på kraftigt forstørrede nakkeskæl og er enten farvet med lyse pletter eller næsten sort. Der findes næsten ingen viden om pasningen af netop denne art, så meget er lånt fra beslægtede vandvaraner.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus salvator nuchalis; Hydrosaurus nuchalis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**52-60 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vanddel** dybde 35-50 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-10 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**187-220 dage** ved 27-31,5 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten var tidligere en underart af *Varanus salvator*, som private ikke må holde i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr). Om forbuddet også omfatter *Varanus nuchalis*, er uafklaret. Spørg Fødevarestyrelsen, før du køber. Arten står desuden på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb og salg kræver dokumentation for lovlig oprindelse (CITES-papirer eller EU-dokumenter).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Varanus nuchalis*. Tallene er lånt fra nære slægtninge i samme gruppe, især *Varanus cumingi* og *Varanus salvator*.

TEMPERATUR
Varanus nuchalis skal have en baggrundstemperatur på 27-32 °C om dagen. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 52-60 °C, målt med IR-termometer på selve solpladsen, ikke i luften.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 60-70 %. Et stort vandbassin holder i sig selv fugten oppe, og et fugtigt, dybt substrat giver dyret et sted at trække sig tilbage.

VAND OG VANDKVALITET
Arten er knyttet til vand, så en stor vanddel er ikke valgfri. Den skal være så stor, at hele dyret kan ligge nedsunket og svømme, og dybden bør være 35-50 cm til et voksent dyr.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig, så kraftigt lys og UVB er nødvendigt. Den hører til Ferguson-zone 3 ligesom andre dagaktive varaner, der soler sig meget.

FODER
Kosten for *Varanus nuchalis* i naturen er ikke undersøgt. Beslægtede vandvaraner æder mange slags dyr og ådsler, og kosten herunder er lånt fra dem.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Varanus nuchalis skal håndteres som andre store vandvaraner. Selv en mellemstor varan har skarpe tænder, stærke kløer og en kraftig hale, som den kan piske med. Et bid kan give dybe sår, og kløerne kan rive huden op.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Filippinerne.