herpy

VARANER

Northern Pilbara Rock Monitor

Varanus pilbarensis

En lille, rødbrun klippevaran fra Pilbara i det nordvestlige Australien, med store, lysegrå øjepletter på ryggen og en lang, tydeligt båndet hale. *Varanus pilbarensis* bliver 45-50 cm lang og er sky og dagaktiv. Den har brug for en meget varm solplads, klippestruktur at klatre og gemme sig i og en kølig periode om vinteren.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-50 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**12-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Hotspot	**45-50 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**18 °C** 8-9 uger
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-9 æg**
Inkubation	**100-120 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (som en del af Varanus spp.). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 (komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så den må holdes af private efter de almindelige regler. Ved køb og salg inden for EU hører der EU-dokumentation til dyret, og CITES-papirer kræves ved indførsel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent par skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Arten er aktiv og vandrer rundt på klippefladerne, så bundarealet er vigtigere end højden.
TEMPERATUR	Arten har brug for en stor temperaturgradient. Mål overfladetemperaturen med et IR-termometer: på det varmeste sted, solpladsen under lampen, skal sten eller grene være omkring 45 °C og gerne op til 50 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 50-70 %. Det er en art fra tørt klippeterræn, så terrariet skal ikke være vådt, men et fugtigt skjul skal altid være til rådighed, så dyret kan skifte hud uden problemer.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og bruger meget tid på at sole sig, så lys og UVB er en grundpille i pasningen. Brug lysstofrør eller LED til almindeligt dagslys og en kraftig spotlampe over solpladsen til varme.
FODER	*Varanus pilbarensis* æder i naturen insekter, andre hvirvelløse dyr og små krybdyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Varanus pilbarensis* er sky og hurtig og ikke et dyr, der skal håndteres meget. Den kan bide, hvis den bliver grebet, men kæberne og kløerne er små, og skaderne er sjældent alvorlige. Kløerne kan dog ridse huden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.