herpy

VARANER

Yellow tree monitor

Varanus reisingeri

En slank, gul og sort trævaran fra øen Misool i Indonesien med en lang gribehale og lysende gule pletter på ryggen. Arten er sjælden i terrarier, kræver et højt og varmt terrarie med stor fugtighed og hører til hos den erfarne varanholder, ikke hos begynderen.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**80-95 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**35-48 °C**
Temperatur, nat	**24 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-7 æg**
Inkubation	**160-170 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står som de fleste varaner på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97). Ved køb og salg inden for EU skal sælgeren kunne dokumentere, at dyret er lovligt erhvervet, og ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-papirer. Arten er ikke nævnt i forbuddet mod hold af særlige dyr (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler i dyrevelfærdsloven gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr har brug for et højt, hjemmebygget terrarie på mindst 120 × 60 × 180 cm (længde × bredde × højde), og højden er vigtigere end bundarealet.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet skal være 27-32 °C, og natten må ikke blive koldere end omkring 24 °C. Over en solplads, som dyret kan komme helt tæt på, skal overfladetemperaturen være 35-48 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være høj, omkring 60-90 %, og gerne over 70 %. Hold den ved at sprøjte terrariet kraftigt med hånden om morgenen og lade luften tørre lidt op hen på eftermiddagen. Sprøjt igen om aftenen.
LYS OG UVB	*Varanus reisingeri* er dagaktiv og skal have 12 timers lys om dagen med lysstofrør eller LED.
FODER	*Varanus reisingeri* er en alsidig jæger, der æder insekter og andre hvirvelløse dyr samt mindre hvirveldyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Vildfangne dyr er sky, gemmer sig og bliver let stressede. Det kan tage flere måneder, før et vildfanget dyr stoler på dig. Sæt hånden roligt ind i terrariet hver dag, og lad dyret komme nysgerrigt hen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/varaner/varanus-reisingeri