herpy

VARANER

Båndvaran

Varanus salvator

Varanus salvator er et af verdens største firben, hanner typisk 150-240 cm og hunner 120-180 cm lange, en halvt vandlevende varan fra sumpe, floder og mangrove i Syd- og Sydøstasien. Vejledningen er et opslagsværk om artens biologi og krav.

Familie: Varanidae Engelsk: Common Water Monitor Tidligere navn: *Stellio salvator* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**120-240 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**3.000-20.000 g**
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**245 × 185 × 245 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**35-60 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vanddel** dybde 35-50 cm
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-40 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**180-270 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Må ikke holdes af private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr, bilag 1). Derudover står arten på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb og salg kræver dokumentation for lovlig oprindelse (CITES-papirer eller EU-dokumenter).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Det, der skal regnes med, er et voksent dyr på 120-240 cm. Et almindeligt terrarie er ikke tilstrækkeligt.

TEMPERATUR
Varanus salvator er varmekrævende og skal have en tydelig temperaturgradient. Baggrundstemperaturen om dagen er 27-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge omkring 60-70 %. Arten kommer fra fugtige, tropiske vådområder, men stillestående, fugtig luft giver hudinfektioner, så god ventilation er lige så vigtig som fugten.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig meget. Brug en kraftig varmelampe over solpladsen og UVB til dyr med stort solbehov (Ferguson-zone 3). UVB skal dække en stor del af solpladsen, og dyret skal samtidig kunne trække sig i skygge.

FODER
Varanus salvator er kødæder og tager næsten alt, hvad den kan overmande: fisk, frøer, krebsdyr, bløddyr, insekter, æg, fugle, gnavere og ådsler.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
En voksen *Varanus salvator* er et stærkt og farligt dyr. Den forsvarer sig med halen, kløerne og kæberne.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Sri Lanka, Indien, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Kina, Malaysia, Singapore og Indonesien.