herpy

VARANER

Spotted Tree Monitor

Varanus similis

Varanus similis er en lille, dagaktiv trævaran fra det nordlige Australien og New Guinea. Den holdes i et højt terrarie med kork, skjul og en varm solplads, lever af foderinsekter og er et sjældent, træboende alternativ til de jordlevende små varaner. Pasningserfaringen er dog lille.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus timorensis similis; Varanus scalaris similis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 80 × 130 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**40-42 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-18 æg**
Inkubation	**120-136 dage** ved 28-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er omfattet af CITES liste II og EU's bilag B, som alle varaner uden strengere listning. Køb og salg inden for EU kræver derfor dokumentation for lovlig herkomst, og dyr, der indføres fra lande uden for EU, kræver CITES-papirer. Arten står ikke på forbudslisten over dyr, der ikke må holdes af private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 80 × 80 × 130 cm (længde × bredde × højde). Til et par er 100 × 100 × 200 cm rigeligt, men ikke overdrevet. Da arten er trælevende, tæller højden mere end gulvarealet.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen i terrariet er 25-30 °C, med 30 °C i de øvre dele og 25 °C nede ved bunden. Solpladsen er en gren eller sten under en spotlampe, der giver en lokal overfladetemperatur på ca. 40 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Den relative luftfugtighed holdes på 60-80 %. Det opnås ved at sprøjte terrariet med vand om aftenen og ved at lade bundlaget holde på fugten, evt. med et svagt varmekabel under bunden.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB. Over solpladsen kan en 150 W HQI-flodlampe med dagslyskvalitet (5000 K) sidde sammen med en 150 W halogen-spotlampe.

FODER
Dyrene tager alle almindelige foderinsekter og er ikke kræsne. Kakerlakker (*Blaptica dubia* og *Blaberus atropus*) i passende størrelse egner sig som hovedføde, og græshopper er en populær afveksling.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyr fanget i naturen er sky i begyndelsen, men det er naturlig adfærd: arten flygter eller skjuler sig, til truslen er forbi, og jager fra baghold. Det betyder ikke, at arten er ekstra frygtsom.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien og Papua Ny Guinea.