herpy

VARANER

Spencer's Monitor

Varanus spenceri

Varanus spenceri er en kraftigt bygget, jordlevende varan på op til 120 cm, der lever på de træløse sortjordssletter i det nordøstlige Australien og graver sig ind i jordens sprækker og huler. Den spiser næsten alt, hvad den kan overmande, og spiller død, når den bliver truet. Arten er yderst sjælden uden for Australien, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus ingrami*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-120 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 120 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-35 °C**
Hotspot	**50-58 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**11-30 æg**
Inkubation	**180-190 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står som de fleste varaner på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må derfor holdes af private efter de almindelige regler, bl.a. dyrevelfærdsloven. Bed sælgeren om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse; ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Varanus spenceri*, fordi arten næsten ikke holdes uden for zoologiske haver.
TEMPERATUR	Varaner er dagaktive, og *Varanus spenceri* skal have en stor temperaturgradient: en varm solplads og køligere zoner, hvor dyret kan trække sig tilbage.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre sletter, så luftfugtigheden i terrariet skal være lav: 30-60 %, med god ventilation. Tallene er lånt fra *Varanus gouldii*.
LYS OG UVB	*Varanus spenceri* er dagaktiv og lever i åbent landskab uden skygge, hvor den soler sig meget.
FODER	I naturen spiser arten næsten alt, hvad den kan overmande: slanger, små pattedyr, små firben, æg og ådsler. Foderet skal i fangenskab være varieret og bestå af hele byttedyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Sikkerhed: *Varanus spenceri* er stærk og har skarpe kløer og en kraftig hale, og et bid fra et dyr på op mod en meter kan give dybe sår. Et truet dyr hvæser, fylder halsen ud og slår med halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.