herpy

VARANER

Solomon Island spiny monitor

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus er en sjælden og næsten ukendt varan fra Salomonøerne og Bougainville, kendt på sin sandpapirsagtige, tornede skælstruktur og rækker af store gule pletter på mørk bund. Pasningen bygger på beslægtede arter, fordi der næsten ikke er erfaring med arten i fangenskab.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus indicus spinulosus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-100 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 120 × 200 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**40-48 °C**
Temperatur, nat	**24-25 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vanddel** dybde 10-40 cm
Vandtemperatur	**26-29 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-7 æg**
Inkubation	**150-195 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Varanus står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb, salg og indførsel kræver dokumentation for lovlig oprindelse (CITES-papirer og EU-dokumenter ved grænsen). Arten står ikke på listen over dyr, private ikke må holde i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler om dyrevelfærd og CITES/EU gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Målene er lånt fra beslægtede, ca. 100-140 cm lange varaner. Et voksent dyr af *Varanus spinulosus* skal have et hjemmebygget terrarie eller et helt rum på mindst 300 × 120 × 200 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Temperaturerne for *Varanus spinulosus* er lånt fra *V. juxtindicus* og andre arter i *V. indicus*-gruppen. Lufttemperaturen holdes på 27-30 °C om dagen og 24-25 °C om natten, og vandet på 26-29 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden er lånt fra beslægtede arter: omkring 60-80 % om dagen og 85-98 % om natten. Faktaboksen viser spændet 60-90 %. Det opnås med et stort vandparti, fugtigt substrat og daglig sprøjtning.
VAND OG VANDKVALITET	Slægtningene i *V. indicus*-gruppen svømmer og dykker flittigt og sover i vandet, så et fast vandparti anbefales, selv om arten ikke er kendt som semi-akvatisk.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig i fuld sol midt på dagen, så den har brug for kraftigt lys og UVB som voksen.
FODER	I naturen æder arten leddyr, æg fra storfodshøns, fisk og småfugle. Den kommer ud af skoven for at tage indvolde fra rensede fisk, plyndrer hønsehuse og søger føde i tidevandszonen. Arten er en alsidig, delvis ådselædende jæger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky i naturen og flygter op i palmekroner. Et fanget dyr kan hvæse og alligevel falde hurtigt til ro uden at forsøge at bide, men mere er ikke kendt om temperamentet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Salomonøerne og Papua Ny Guinea.