herpy

VARANER

Storr's Monitor

Varanus storri

En lille, hurtig og jordlevende dværgvaran fra Queensland i Australien, der bliver omkring 30 cm og lever af insekter. Den kræver et langt, varmt terrarie med dybt substrat at grave i, UVB og skjul under sten, og den er et dyr til observation, ikke til daglig håndtering. Dyrene kan blive mindst 12 år.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**45 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**50-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-6 æg**
Inkubation	**100 dage** ved 28-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står som de fleste varaner på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 (komodovaran, båndvaran, papuavaran, nilvaran og centralafrikansk nilvaran), så den må holdes af private efter de almindelige regler. Bed sælgeren om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse; ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-papirer.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 80 × 50 × 60 cm (længde × bredde × højde), og et større er bedre. Arten lever på jorden, så gulvarealet tæller mere end højden.
TEMPERATUR	Der skal være en stor temperaturgradient, så dyret selv kan vælge. Angivelserne for gradienten går fra omkring 24 °C i den kølige ende til omkring 45 °C på solpladsen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden i terrariet er moderat, omkring 50-60 %.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og afhængig af stærkt lys og UVB. Brug dagslysrør eller LED-lys, kombineret med en kraftig lyskilde med UVB, fx en kviksølvdamplampe eller en metalhalogenlampe, som giver både varme og UV.
FODER	*V. storri* lever mest af insekter og andre hvirvelløse dyr. Giv fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og larver af kæmpemelorm, i den størrelse dyret let kan fange.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*V. storri* er hurtig og vagtsom. Den er lille, og bid fra et dyr på 30 cm er ikke alvorlige som fra de store varaner, men de skarpe kløer og de spidse tænder kan give sår, som skal renses grundigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.