herpy

VARANER

Black-tailed Monitor

Varanus tristis

Varanus tristis er en lille, hurtig og træklatrende varan fra Australiens tørre indre med sort hoved og hale og en fin rødbrun nettegning på ryggen. Den bliver op til 75 cm, er dagaktiv og kræver et højt, varmt og solrigt terrarie. Den er sjælden i fangenskab, og der findes kun få pålidelige erfaringer med pasning og avl.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus punctatus; Varanus timorensis tristis; Odatria punctata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-75 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**150-330 g**
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Hotspot	**42-50 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**8-12 æg**
Inkubation	**114-117 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, som alle varaner uden en strengere listning. Ved import til EU og ved visse former for handel kræves CITES- og EU-dokumenter, så spørg sælger efter papirerne og gem dem. Arten er ikke omfattet af det danske forbud mod hold af særlige dyr (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så for private gælder de almindelige regler, bl.a. dyrevelfærdsloven.

Pasning i korte træk

TERRARIET	En tommelfingerregel for træboende varaner er et terrarie, der er mindst 5 gange dyrets snude-kloak-længde langt, 2 gange bred og 4 gange høj.
TEMPERATUR	Temperaturerne for *Varanus tristis* er lånt fra beslægtede, tørt-levende australske dværgvaraner og er et forsigtigt udgangspunkt. Mål altid overfladetemperaturen på solpladsen med et IR-termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra tørre egne og skal ikke have høj luftfugtighed. Omkring 30-50 % er et forsigtigt udgangspunkt.
LYS OG UVB	UVB er vigtig for dagaktive varaner, der soler sig meget.
FODER	I naturen er arten rovdyr på firben, fuglekyllinger og æg og tager sandsynligvis også insekter. I fangenskab er insekter det naturlige grundfoder: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og larver af kæmpemelorm.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Varanus tristis* er en hurtig, nervøs art, og vildfangne dyr er ofte forsvarsberedte og stressede. Dyrene bider, hvis de bliver grebet, og kløerne er lange og skarpe og kan give dybe rifter.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/varaner/varanus-tristis