herpy

VARANER

Tricoloured monitor lizard

Varanus yuwonoi

Varanus yuwonoi er en sjælden, farvestrålende varan fra skovene på Halmahera i Indonesien, med sort forkrop, en bagkrop finprikket med grønt, blåt og sort og en blå hale. Dyrene i handlen er næsten alle vildfangede, og pasning og avl er næsten ukendt. Den hører hjemme hos meget erfarne holdere med plads til et helt rum.

Familie: Varanidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 150 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**23-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-9 æg**
Inkubation	**164-166 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så dyr, der indføres fra lande uden for EU, kræver CITES-papirer og EU-dokumenter. Arten er ikke nævnt i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må derfor holdes af private efter de almindelige regler i dyrevelfærdsloven.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Varanus yuwonoi* bygger på den nærtbeslægtede *Varanus melinus* i samme gruppe og på skøn.
TEMPERATUR	I naturen er der 25-30 °C hele året i lavlandet. I terrariet skal der være en stor temperaturgradient.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten lever i et fugtigt skovklima uden tørtid. Hold luftfugtigheden på 70-90 % med daglig sprøjtning og et fugtigt substrat, især nederst, hvor dyret graver. Tallet er et skøn ud fra klimaet og slægtningene.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for kraftigt lys og UVB. Brug UVB-rør eller UVB-pærer sammen med en eller flere solpladslamper, så dyret kan vælge mellem sol og skygge. Ferguson-zone 3 er et godt udgangspunkt.
FODER	Føden i naturen er ikke undersøgt, men arten tager formentlig fugle, øgler, slanger og hvirvelløse dyr ved redehøjene og graver efter æg.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er aggressiv, når den håndteres. Den har et forholdsvis kraftigt hoved og meget lange tænder, så et bid kan give dybe skader, og kløerne og halen kan give slemme rifter, så tag ikke fat i dyret uden stor erfaring.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien.