herpy

AGAMEN

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae ist eine tagaktive Felsenagame aus Savanne und Halbwüste in Ostafrika. Beim dominanten Männchen ist der Körper dunkelblau, Kopf, Hals und Schultern sind rot oder violett. Die Art ist schnell, klettert gut und braucht ein geräumiges, trockenes Terrarium mit einem sehr warmen Sonnenplatz und kräftigem UVB.

Familie: Agamidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-23 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste, Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-35 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**20-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**5-7 Eier**
Inkubation	**60-90 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Agama mwanzae wird in Menschenhand gehalten und vermehrt, aber die Pflege ist nur spärlich beschrieben. Die Angaben zur Zucht sind von der nah verwandten *Agama agama* übernommen.

TEMPERATUR

Agama mwanzae braucht ein deutliches Temperaturgefälle. Der Sonnenplatz soll eine Oberflächentemperatur von 40-45 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll bei 20-40 % liegen. Stelle immer eine flache, standfeste Schale mit frischem Wasser ins Terrarium, und wechsle das Wasser täglich, denn die Art trinkt viel.

LICHT UND UVB

Agama mwanzae ist tagaktiv und sonnt sich viel, daher braucht sie kräftiges Licht und UVB entsprechend Ferguson-Zone 3.

FÜTTERUNG

Agama mwanzae ist ein Insektenfresser. Biete eine abwechslungsreiche Kost aus gut gefütterten Insekten an: Schaben und Grillen als Hauptfutter und Mehlwürmer und Riesenmehlwürmer in kleineren Mengen.

VERHALTEN UND UMGANG

Agama mwanzae ist schnell, wachsam und territorial. Zwei Männchen dürfen niemals zusammen gehalten werden, denn sie kämpfen und fügen einander schwere Verletzungen zu.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Tansania, Kenia und Ruanda.