herpy

AGAMEN

Kragenechse

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii ist eine große, baumbewohnende Agame aus dem Norden Australiens und dem Süden Neuguineas. Sie ist bekannt für den großen Hautkragen um den Hals, den sie bei drohender Abwehr aufspreizt. Sie wird 60-90 cm lang, ist tagaktiv und ernährt sich von Insekten. Dafür braucht sie ein sehr hohes Terrarium, kräftige Wärme und UVB, und sie ist scheu und leicht zu stressen.

Familie: Agamidae Englisch: Frilled Lizard Früherer Name: *Clamydosaurus kingii*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**60-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**400-870 g**
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Trockenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 75 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**38-42 °C**
Temperatur, Nacht	**23-27 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Gelegegröße	**4-20 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-4**
Inkubation	**70-110 Tage** bei 28-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 150 × 75 × 150 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Höhe ist wichtiger als die Grundfläche, denn die Art ist baumbewohnend, und wie hoch das Tier sitzen kann, gibt Sicherheit.
TEMPERATUR	Der Sonnenplatz muss im oberen Teil des Terrariums liegen und eine Oberflächentemperatur von 38-42 °C haben, als Ausgangspunkt etwa 40 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 60-70 % liegen, und das Terrarium muss besprüht werden. Die Art lebt in einem Klima mit kräftigem Regen im Sommer und trinkt Wassertropfen.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich, daher braucht sie kräftiges Licht über das ganze Terrarium und einen Sonnenplatz mit Wärme- und UVB-Licht.
FÜTTERUNG	*Chlamydosaurus kingii* ist ein Insektenfresser. Das Futter besteht aus Grillen, Schaben, Raupen, Seidenraupen und gelegentlich Superwürmern. Termiten und Ameisen sind in der Natur die wichtigsten Beutetiere.
VERHALTEN UND UMGANG	*C. kingii* ist ruhig und sitzt still im Terrarium, aber scheu gegenüber Bewegungen im Raum.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien, Papua-Neuguinea und Indonesien.