herpy

AGAMEN

Grüne Wasseragame

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus ist eine große, grüne, halbaquatische Agame aus bewaldeten Bachläufen in Südostasien. Sie wird bis zu etwa 90 cm lang, wovon über zwei Drittel auf den Schwanz entfallen. Die Art ist tagaktiv, klettert und taucht und braucht ein sehr großes, hohes und feuchtes Terrarium mit einem tiefen Wasserteil, starkem UVB und einem warmen Sonnenplatz. Ein großer Teil der Tiere im Handel ist wildgefangen.

Familie: Agamidae Englisch: Chinese Water Dragon Früherer Name: *Dilophyrus mentager*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**70-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**250-600 g**
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**180 × 90 × 180 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**21-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 15-30 cm
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Pflanzen und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**5-18 Eier**
Inkubation	**60-75 Tage** bei 29-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein einzelnes erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 180 × 90 × 180 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Der Sonnenplatz muss 35-40 °C haben, gemessen mit einem digitalen Thermometer direkt auf dem Ast. Jungtiere brauchen einen Sonnenplatz am unteren Ende des Bereichs. Die Luft im kühlen Bereich muss 25-28 °C haben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll 60-80 % betragen, am höchsten morgens (ca. 75-80 %) und niedriger abends (ca. 50-60 %).
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil soll so groß sein, dass das Tier tauchen und schwimmen kann: mindestens 15 cm tief, gern mehr, und er soll ein Drittel bis die Hälfte der Grundfläche einnehmen.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und braucht starkes UVB entsprechend Ferguson-Zone 3. Verwende eine T5-HO-Röhre mit 10-12 % UVB in einer reflektierenden Armatur auf derselben Seite wie die Wärmelampen.
FÜTTERUNG	*Physignathus cocincinus* ist ein Allesfresser, lebt aber überwiegend von Insekten. Jungtiere fressen fast nur Insekten, und mit dem Alter kommen mehr Pflanzen hinzu. Jungtiere unter 3 Monaten: täglich kleine Heimchen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Physignathus cocincinus* ist scheu und stressanfällig, besonders bei Wildfängen. Lass ein neues Tier ohne Anfassen eingewöhnen und beginne dann, Futter mit einer Pinzette zu reichen, damit das Tier zu dir kommt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China, Vietnam, Laos, Kambodscha und Thailand.