herpy

AGAMEN

Östliche Bartagame

Pogona barbata

Pogona barbata ist eine der größten Bartagamen: eine kräftige, tagaktive Agame von 50-65 cm aus den östlichen Wäldern und Buschlandschaften Australiens, mit einem gut ausgebildeten, dunklen Bart und gelbem Maulinneren. Sie ist territorialer als *Pogona vitticeps*, klettert gern und braucht ein großes Terrarium, kräftige Wärme und UVB.

Familie: Agamidae Englisch: Eastern Bearded Dragon Früherer Name: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-65 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend, bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-37 °C**
Sonnenplatz	**42-45 °C**
Temperatur, Nacht	**12-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Gelegegröße	**15-35 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-3**
Inkubation	**55-75 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Die Haltung von *P. barbata* ist für die Art selbst nur spärlich beschrieben.
TEMPERATUR	Beheize mit mindestens zwei Halogenspots über dem Sonnenplatz.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll im Durchschnitt bei 30-60 % liegen, gemessen am kühlen Ende. Sie schwankt natürlich: niedriger am Sonnenplatz, höher nachts und am Wasser.
LICHT UND UVB	*Pogona barbata* ist auf kräftiges, weißes Licht angewiesen, das Appetit und Aktivität fördert. Das Terrarium soll sehr hell sein, und der Sonnenplatz soll die hellste Stelle sein.
FÜTTERUNG	*P. barbata* ist ein Allesfresser. In der Natur besteht die Nahrung aus Insekten, Würmern, kleinen Wirbeltieren und Pflanzenteilen. Junge Tiere bekommen überwiegend Insekten und erwachsene überwiegend Pflanzen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Pogona barbata* ist territorial und zeigt das deutlicher als *Pogona vitticeps*. Ein schwarzer, aufgestellter Bart, offenes Maul mit dem gelben Inneren, Zischen und ein kleiner Sprung auf den Gegner zu sind Drohungen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.