herpy

AGAMEN

North-west Bearded Dragon

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli ist eine schlanke, tagaktive Bartagame von etwa 40 cm aus dem tropischen Nordwesten Australiens, mit einem schwachen Bart und kräftigeren Stacheln im Nacken als *Pogona minor*. Die Haltung folgt den nächsten Verwandten: Wärme, kräftiges UVB, grabbarer Bodengrund und überwiegend Insekten.

Familie: Agamidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-37 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**5-19 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-4**
Inkubation	**58-64 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Pogona mitchelli* ist nur wenig bekannt. Das Klima im Verbreitungsgebiet ist das ganze Jahr über warm, mit einer kurzen Regenzeit und einer langen, trockenen Periode mit kühlen Nächten.
TEMPERATUR	Heize mit mindestens zwei Halogenspots über dem Sonnenplatz. Die Oberfläche dort muss 40-45 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer, und der warme Fleck muss mindestens so groß sein wie das ganze Tier.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 30-60 % liegen, gemessen am kühlen Ende, und das Terrarium muss zwischen den Sprühvorgängen abtrocknen können.
LICHT UND UVB	*Pogona mitchelli* ist tagaktiv und braucht sehr helles, weißes Licht und kräftiges UVB. Verwende eine T5-HO-Röhre mit 10-14 % UVB in einer reflektierenden Armatur über der warmen Seite, parallel zu den Wärmelampen.
FÜTTERUNG	*Pogona mitchelli* wird überwiegend mit Insekten und etwas Grünfutter gefüttert: Frisch geschlüpfte Tiere (unter 3 Monaten): Insekten 2-3 Mal täglich und täglich Grünfutter. Jungtiere (3-12 Monate): täglich Insekten und Grünfutter.
VERHALTEN UND UMGANG	*Pogona mitchelli* ist tagaktiv und sonnt sich viel.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.