herpy

AGAMEN

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar ist eine Dornschwanzagame aus der Sahara und dem Sahel mit vier Unterarten, darunter die große *U. d. flavifasciata* und die häufig gehaltene *U. d. maliensis* aus Mali. Die Art wird je nach Form 28-50 cm lang, ernährt sich pflanzlich und gräbt sich in tiefem Bodengrund ein. Sie braucht ein großes, warmes und trockenes Terrarium mit kräftiger UVB-Beleuchtung und ist eher ein Tier zum Beobachten als zum Anfassen.

Familie: Agamidae Früherer Name: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**28-50 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**200-400 g**
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend, bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Wüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**29-35 °C**
Sonnenplatz	**45-50 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**20-30 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Winterruhe	**18-21 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Pflanzen**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**36 Monate**
Gelegegröße	**10-20 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**60-80 Tage** bei 33 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein erwachsenes Tier der Nominatform oder von *U. d. maliensis* braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser.

TEMPERATUR
Der Sonnenplatz soll eine Oberflächentemperatur von 45-50 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer direkt unter der Lampe. Die Terrarienmitte liegt bei 35-38 °C und die kühle Seite bei 29-35 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit soll unter 30 % liegen. Die Art verträgt etwas höhere Luftfeuchtigkeit, solange das Terrarium trocken und warm genug ist, aber sie verträgt es nicht, kalt und feucht gehalten zu werden.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht kräftiges Licht. Verwende zusätzlich zum Wärmestrahler eine LED-Lampe oder eine Leuchtstoffröhre mit ca. 6500 K als Tageslicht.

FÜTTERUNG
Uromastyx dispar ist ein Pflanzenfresser. Das Grundfutter ist eine Mischung aus Salat und Blattgemüse, z. B.

VERHALTEN UND UMGANG
Erwachsene Tiere sind territorial, vor allem Männchen gegenüber Männchen, und zwei Männchen dürfen niemals zusammen gehalten werden.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Algerien, Westsahara, Mali, Mauretanien, Sudan und Tschad.