herpy

AGAMEN

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata ist eine kleine, kompakte Dornschwanzagame aus den Felswüsten rund um den südlichen Teil des Roten Meeres. Der Rücken ist mit hellen Augenflecken geziert, und das Männchen ist farbenprächtiger als das Weibchen. Die Art wird 25-30 cm lang, ernährt sich von Pflanzen und gräbt sich in tiefem, trockenem Bodengrund ein. Sie braucht ein warmes, trockenes Terrarium mit kräftiger UVB-Beleuchtung und wird leicht mit ihren nächsten Verwandten verwechselt.

Familie: Agamidae Früherer Name: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-30 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend, bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Wüste, Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**50-55 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**20-30 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Pflanzen**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**36-60 Monate**
Gelegegröße	**4-20 Eier**
Inkubation	**60-70 Tage** bei 33-34 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser.

TEMPERATUR

Der Sonnenplatz soll eine Oberflächentemperatur von 50-55 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer direkt unter der Lampe. Die kühle Seite liegt bei 27-32 °C. Die Wärme muss von oben kommen, z.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll niedrig sein, etwa 20-30 %, gemessen am Boden auf der kühlen Seite. Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit macht das Tier krank, also besprühe das Terrarium nicht.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und braucht kräftiges Licht. Verwende eine LED-Lampe oder eine Leuchtstoffröhre mit ca. 6500 K als Tageslicht, getrennt von der Wärme; die Tiere sind damit aktiver und fressen besser.

FÜTTERUNG

Uromastyx ocellata ist ein Pflanzenfresser. Etwa 90 % des Futters sollen aus Blattgemüse und Blüten bestehen, ca. 5 % aus hartem Gemüse und ca. 5 % aus Trockenfutter.

VERHALTEN UND UMGANG

Erwachsene Tiere sind ruhig und standorttreu, aber territorial gegenüber Artgenossen, besonders Männchen gegenüber Männchen. Halte sie einzeln.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Ägypten, Sudan, Eritrea, Dschibuti, Äthiopien und Somalia.