herpy

AGAMEN

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella ist eine hellgrüne, sehr schlanke baumbewohnende Agame aus den Wäldern Südostasiens, deren Schwanz über drei Viertel der Länge ausmacht. Sie wird 50-58 cm lang, ist tagaktiv und jagt Insekten in den Bäumen. Sie kann von klarem Grün zu Braun wechseln, wenn sie unruhig wird, und ist schnell, sprungstark und scheu.

Familie: Agamidae Englisch: Green Crested Lizard Früherer Name: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana*
Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-58 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**32-38 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2 Eier**
Inkubation	**47-80 Tage** bei 27-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Bronchocela cristatella* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Die Temperatur folgt dem Klima im Verbreitungsgebiet. Die Tagestemperatur im Terrarium muss bei 25-30 °C liegen, und an einem Sonnenplatz hoch oben auf einem Ast muss es 32-38 °C geben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die relative Luftfeuchtigkeit muss bei 70-90 % liegen, wie in einem tropischen Tieflandwald. Sprühe das Terrarium zweimal täglich gründlich, sodass Blätter und Äste nass sind.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich an Waldrändern und auf Lichtungen, daher braucht sie starkes Licht und UVB.
FÜTTERUNG	*Bronchocela cristatella* ernährt sich von Insekten, die sie in Büschen und Bäumen fängt, unter anderem Wanzen.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist scheu und wird leicht gestresst. Unter Stress wird sie braun, und sie kann ins Laub fliehen oder von den Ästen springen. Sie ist für das Handling nicht geeignet und ein Tier zum Anschauen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Malaysia, Singapur, Indonesien, Philippinen, Thailand und Brunei Darussalam.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/agamer/bronchocela-cristatella