herpy

AGAMEN

Leiolepis triploida

Leiolepis triploida ist eine bodenlebende, tagaktive Agame von der Malaiischen Halbinsel, bei der alle Tiere Weibchen sind. Die Art hat drei Chromosomensätze und pflanzt sich durch Jungfernzeugung fort: Die Eier entwickeln sich ohne Männchen, und die Jungtiere sind genetische Kopien der Mutter. Sie ist groß und sehr langschwänzig, gräbt Höhlen und verlangt ein trockenes Terrarium mit tiefem Bodengrund, kräftiger Wärme und UVB.

Familie: Agamidae Englisch: Thai Butterfly Lizard Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-45 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-35 °C**
Sonnenplatz	**35-37 °C**
Temperatur, Nacht	**20-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-3 Eier**
Inkubation	**55-100 Tage** bei 27-33 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Leiolepis triploida* gibt es nur wenig Wissen. Die Haltung beruht daher auf *Leiolepis belliana*, der am besten bekannten Art der Gattung.
TEMPERATUR	Der Sonnenplatz muss an der Oberfläche eine Temperatur von 35-37 °C haben. Die Luft auf der warmen Seite hat 30-35 °C, und die kühle Seite 26-29 °C. Nachts fällt die Temperatur auf 20-25 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss bei 30-50 % liegen, und das Terrarium muss trocken sein.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich im offenen Gelände, daher braucht sie kräftiges Licht und UVB. Verwende eine Röhre oder LED mit 6.500 K über dem ganzen Terrarium und eine T5-HO-UVB-Röhre mit 10-12 % über dem Sonnenplatz.
FÜTTERUNG	Die Kost ist für *Leiolepis triploida* nicht untersucht. Die Arten der Gattung fressen sowohl Pflanzen als auch Insekten, und bei mehreren machen die Pflanzen den Hauptteil aus.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Tier ist scheu und schnell und flieht in eine Höhle, wenn sich etwas bewegt. Es verträgt Handling schlecht. Da alle Tiere Weibchen sind, besteht keine Gefahr von Kämpfen zwischen Männchen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Thailand und Malaysia.