herpy

AGAMEN

Zwergbartagame

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni ist die kleinste Bartagame: eine niedrige, kompakte Agame von höchstens ca. 30 cm aus den baumlosen schwarzen Lehmbodenebenen im zentralen Queensland, mit einem schwach ausgebildeten Bart und einem kurzen, stumpfen Kopf. Sie ist tagaktiv, ruhig und kommt mit weit weniger Platz aus als *Pogona vitticeps*, hat aber denselben Bedarf an Wärme, kräftigem UVB und einem grabbaren Bodengrund und wird 10-15 Jahre alt.

Familie: Agamidae Englisch: Black-soil Bearded Dragon Früherer Name: *Pogona brevis* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-30 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**38-45 °C**
Temperatur, Nacht	**13-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Gelegegröße	**5-19 Eier**
Gelege pro Jahr	**2**
Inkubation	**58-64 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein einzelnes erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 45 cm, und mehr Platz wird genutzt. Eine kleine Gruppe, z. B. ein Männchen mit einem oder mehreren Weibchen, erfordert mindestens 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Der Sonnenplatz soll eine Oberflächentemperatur von 38-45 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer auf dem Stein. Das kühle Ende soll 24-29 °C haben.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll im Durchschnitt bei 30-50 % liegen, gemessen in der Mitte des Terrariums mit einem digitalen Hygrometer. Kurze Ausschläge nach oben oder unten sind ungefährlich.

LICHT UND UVB

P. henrylawsoni ist tagaktiv und braucht viel helles, weißes Licht und kräftiges UVB.

FÜTTERUNG

P. henrylawsoni ist ein Allesfresser und frisst überwiegend Insekten und Blattgrün. Frisch geschlüpfte (unter 3 Monate): Insekten 2-3 Mal täglich und täglich Grünfutter.

VERHALTEN UND UMGANG

P. henrylawsoni ist ruhig und verträgt vorsichtiges Anfassen, mag es aber nicht, festgehalten oder auf den Rücken gedreht zu werden, und wehrt sich, wenn das geschieht.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.