herpy

AGAMEN

Pogona minor

Pogona minor ist eine mittelgroße, verhältnismäßig schlanke und tagaktive Bartagame von 30-40 cm aus dem südwestlichen und zentralen Australien, mit nur einem schwachen Bart aus kleinen Stacheln. Sie lebt in Dünen, Gebüsch und trockenen Wäldern, frisst überwiegend Insekten und legt mehrere kleine Gelege pro Jahr.

Familie: Agamidae Englisch: Western Bearded Dragon Früherer Name: *Amphibolurus minor; Pogona loriae* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-37 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**13-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**5-19 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-4**
Inkubation	**58-64 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Die Haltung von *P. minor* ist nur spärlich beschrieben. Die Werte für Terrarium, Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Futter und Lebensdauer sind von *Pogona vitticeps* und der kleineren *Pogona henrylawsoni* übernommen.

TEMPERATUR

Beheize mit mindestens zwei Halogenspots über dem Sonnenplatz. Die Oberfläche dort soll 40-45 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer, und der warme Fleck soll mindestens so groß sein wie das ganze Tier.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll bei 30-50 % liegen, gemessen am kühlen Ende, und das Terrarium muss abtrocknen können, denn die Art lebt in trockenen Gegenden. Stehende, nasse Luft und nasser Bodengrund führen zu Krankheit.

LICHT UND UVB

Pogona minor ist auf kräftiges, weißes Licht angewiesen, das Appetit und Aktivität fördert. Der Sonnenplatz soll die hellste Stelle sein, und 75-100 % der Länge des Terrariums sollten ausgeleuchtet sein.

FÜTTERUNG

Pogona minor ist überwiegend Insektenfresser. In der Natur machen Insekten und andere Kleintiere etwa 80 % der Nahrung aus und Pflanzenteile etwa ein Fünftel.

VERHALTEN UND UMGANG

Pogona minor ist tagaktiv und sonnt sich viel. Das Tier nutzt Körpersprache wie andere Bartagamen: Die Männchen nicken gegenüber Rivalen mit dem Kopf, und das Winken mit einem Vorderbein ist ein Zeichen der Unterwerfung.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.