herpy

BLINDWÜHLEN

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana ist eine kleine, beinlose Blindwühle, die nur in den Taita Hills im Südosten Kenias vorkommt. Das Weibchen legt wenige Eier in eine Kammer im Boden und bleibt bei ihnen, und die frisch geschlüpften Jungtiere ernähren sich von ihrer äußeren Hautschicht. Die Art ist bedroht, und über ihre Haltung in menschlicher Obhut ist fast nichts bekannt.

Familie: Herpelidae Früherer Name: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**24-30 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Grabend**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-24 °C**
Temperatur, Nacht	**19-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**90-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Direktentwicklung (keine Larven)**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**24 Monate**
Eier pro Saison	**5**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Über die Haltung von *Boulengerula taitana* ist nur wenig bekannt. Das Klima in den Taita Hills ist tropisch, aber wegen der Höhe mild, mit zwei Regenzeiten, und die Art lebt in feuchter, lockerer Erde.

TEMPERATUR
Die Bodentemperatur ist für die Art nicht gemessen worden. 21-24 °C am Tag und 19-22 °C in der Nacht sind eine Schätzung, die zu landlebenden Blindwühlen und einem milden Bergklima passt.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Der Bodengrund muss gleichmäßig feucht sein, und die Luft in der Box ist fast gesättigt, 90-100 %.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Die Art braucht weder Wassernapf noch Wasserteil. Kondenswasser an den Wänden der Box reicht zum Trinken aus, und das Wasser dient nur dazu, den Bodengrund feucht zu halten.

LICHT UND UVB
Die Art lebt unter der Erde und braucht weder UVB noch sonstige Beleuchtung. Der normale Tagesrhythmus des Raumes mit 10-14 Stunden Licht reicht aus. Die Box wird dunkel gehalten und darf nicht in direkter Sonne stehen.

FÜTTERUNG
In der Natur frisst *Boulengerula taitana* vor allem Termiten und Regenwürmer; die Jungtiere nehmen hauptsächlich Regenwürmer. In menschlicher Obhut sind kleine Regenwürmer das realistischste Grundfutter. Verwende kleine Würmer, z.

VERHALTEN UND UMGANG
Boulengerula taitana lebt versteckt unter der Erde, und ein gesundes Tier liegt die meiste Zeit eingegraben. Die Art wird einzeln gehalten, damit Gewicht und Gesundheit leicht zu verfolgen sind.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Kenia.