herpy

BLINDWÜHLEN

Congo Caecilian

Herpele squalostoma

Herpele squalostoma ist eine kräftige, grabende Blindwühle aus den Regenwäldern, Plantagen und Gärten Zentralafrikas, bis etwa 46 cm lang. Sie legt Eier in die Erde, und das Weibchen liegt um Eier und Jungtiere gerollt, die sich von seiner äußersten Hautschicht ernähren. Die Art hat sich in Gefangenschaft im Vergleich zu anderen Blindwühlen als robust erwiesen.

Familie: Herpelidae Früherer Name: *Caecilia squalostoma*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**24-46 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Grabend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-25 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**90-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Direktentwicklung (keine Larven)**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**16**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

H. squalostoma wird in kleiner Zahl gehalten, und die Haltung stützt sich auf die Art selbst und andere landlebende Blindwühlen. Das Tier lebt am Boden und gräbt, daher dreht sich die Haltung um den Bodengrund.

TEMPERATUR

Die Art wird gleichmäßig und mäßig warm gehalten: 22-25 °C tagsüber und 21-23 °C nachts. Die Durchschnittstemperatur im Boden beeinflusst, wie viel die Tiere fressen, daher muss sie gleichmäßig gehalten werden.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN

Die Luft in der Kiste ist nahezu gesättigt, 90-100 %, weil der Boden feucht ist. Die Feuchtigkeit wird gehalten, indem man den Boden besprüht und gelegentlich die obersten Zentimeter wendet.

WASSER UND WASSERQUALITÄT

Die Art braucht weder Wasserschale noch Wasserteil. Die Feuchtigkeit kommt aus dem Boden, und Kondenswasser an den Wänden der Kiste reicht zum Trinken. Eine Wasserschale kann den Boden zu nass machen.

LICHT UND UVB

Die Art lebt unterirdisch, und ein bestimmtes Lichtprogramm ist nicht notwendig. Der normale Tagesrhythmus des Raumes mit 10-14 Stunden Licht genügt.

FÜTTERUNG

Regenwürmer sind ein bewährtes Grundfutter: Junge Tiere können allein mit Regenwürmern zu großen, kräftigen erwachsenen Tieren heranwachsen, wenn die Würmer mit Kalk und Vitaminen angereichert werden.

VERHALTEN UND UMGANG

H. squalostoma verbringt fast das ganze Leben unter der Erde und wird selten an der Oberfläche gesehen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Nigeria, Kamerun, Äquatorialguinea, Gabun, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa und Zentralafrikanische Republik.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/blindwuehlen/herpele-squalostoma