herpy

BLINDWÜHLEN

Koh Tao Caecilian

Ichthyophis kohtaoensis

Ichthyophis kohtaoensis ist eine grabende Blindwühle aus Südostasien mit einem zweigeteilten Leben: Die erwachsenen Tiere leben in feuchter Erde, während die Jungtiere als wasserlebende Larven mit äußeren Kiemen schlüpfen. Das Weibchen legt die Eier in eine Erdhöhle am Wasser und bewacht sie. Über die Haltung der Art ist nur wenig bekannt.

Familie: Ichthyophiidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Grabend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-25 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**90-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**20-40**
Larvenzeit	**120-240 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ichthyophis kohtaoensis* ist nur wenig bekannt. Die Haltung stützt sich auf Erfahrungen mit grabenden Blindwühlen derselben Größe, die auf dieselbe Weise gehalten werden, u. a. *Geotrypetes seraphini*.
TEMPERATUR	Halte 23-25 °C am Tag und 21-23 °C nachts. Die Temperatur muss stabil sein und höchstens um etwa 3 °C schwanken; schnelle und große Schwankungen werden schlecht vertragen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Der Boden muss gleichmäßig feucht sein, aber nicht so nass, dass sich aus einer Handvoll Wasser pressen lässt, und am Boden der Kiste darf niemals Wasser stehen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Die erwachsenen Tiere brauchen keine Wasserschale. Sie beziehen Wasser aus dem feuchten Boden und aus Kondenswasser an den Wänden der Kiste, und eine Wasserschale macht den Boden leicht zu nass.
LICHT UND UVB	Die Art lebt unterirdisch und braucht weder UVB noch besondere Beleuchtung. Ein normaler Tagesrhythmus im Raum mit 10-14 Stunden Licht genügt. Die Kiste darf nicht in direkter Sonne stehen.
FÜTTERUNG	Regenwürmer sind das Hauptfutter und werden von fast allen landlebenden Blindwühlen genommen. Verwende kleine bis mittelgroße Regenwürmer, z. B. Kompostwürmer, und schneide sie für Jungtiere in Stücke.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ichthyophis kohtaoensis* lebt versteckt und verbringt fast die ganze Zeit eingegraben.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Thailand, Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam.