herpy

BLINDWÜHLEN

## Kaup's Caecilian

# *Potamotyphlus kaupii*

*Potamotyphlus kaupii* ist eine vollständig wasserlebende, aalähnliche Blindwühle aus den Flusssystemen des Amazonas und des Orinoco. Sie hat einen kleineren Kopf und eine hellere Färbung als *Typhlonectes* und braucht sauberes, sauerstoffreiches Wasser. Die Art bringt lebende Junge zur Welt und ist schwieriger zu halten als die verwandten *Typhlonectes*-Arten.

Familie: Typhlonectidae  Früherer Name: *Potomotyphlus kaupii*  **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **30-70 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Gewicht | **60-114 g** |
| Lebenserwartung | **16 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber, in der Dämmerung und nachts** |
| Lebensweise | **Aquatisch** |
| Lebensraum | **Regenwald und Feuchtgebiet** |
| Hautgift | **Schwach**<br>Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **100 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H für 3 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **26-29 °C** |
| Temperatur, Nacht | **26-29 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **100 %** |
| Wasser | **Aquaterrarium**<br>Tiefe 30-35 cm |
| Wassertemperatur | **26-29 °C** |
| UVB | **Nicht nötig** |
| Ernährung | **Insekten, Fertigfutter, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken** |
| Haltung | **In Gruppen** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Lebendgebärend** |
| Entwicklung | **Lebendgebärend** |
| Wurfgröße | **1-9 Jungtiere** |
| Tragzeit | **180-300 Tage** |
| Brutpflege | **Keine** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| EU-Anhang | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | *Potamotyphlus kaupii* wird im Aquarium gehalten. Die Haltung ist weniger gut bekannt als bei *Typhlonectes*, und das Aquarium muss steinige, sauerstoffreiche Fließgewässer nachahmen statt trübes, stehendes Wasser. |
| **TEMPERATUR** | Die Wassertemperatur muss 26-29 °C betragen und stabil gehalten werden; die Art vermehrt sich ohne Jahreszeitenwechsel. Während der Trächtigkeit sind 29 °C gut, denn das ergibt mehr lebensfähige Junge. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit spielt keine Rolle, denn das Tier lebt im Wasser. Die Luft unter einer dicht schließenden Abdeckung ist mit Feuchtigkeit gesättigt, deshalb steht im Datenblatt 100 %. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Blindwühlen nehmen Stoffe über die Haut auf, daher ist die Wasserqualität entscheidend. Der Filter muss eingefahren sein, bevor die Tiere einziehen. |
| **LICHT UND UVB** | Normales Aquarienlicht 12 Stunden am Tag genügt. Die Tiere bevorzugen Dunkelheit, daher müssen immer dunkle Verstecke vorhanden sein. |
| **FÜTTERUNG** | *Potamotyphlus kaupii* frisst Fleischfutter wie die verwandten *Typhlonectes*-Arten: Regenwürmer, Grillen, Käferlarven, Garnelen und andere Krebstiere, Mückenlarven, aufgetaute Fische und Fertigfutter für Amphibien. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | Die Tiere sind gesellig, liegen zusammen im Versteck und werden in Gruppen gehalten. Bei der Fütterung können sie sich in ihrem Eifer um das Futter gegenseitig beißen. Im Aquarium sind sie sowohl tagsüber als auch nachts aktiv. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Venezuela und Französisch-Guayana. |