herpy

BLINDWÜHLEN

Ringed Caecilian

Siphonops annulatus

Siphonops annulatus ist eine blauschwarze, grabende Blindwühle mit weißen Ringen aus Südamerika östlich der Anden. Das Weibchen legt Eier in die Erde und betreut die Jungen etwa drei Monate lang: Sie fressen die äußerste Schicht seiner Haut und trinken eine fettreiche Flüssigkeit aus seiner Kloake. Über die Haltung der Art ist nur wenig bekannt.

Familie: Siphonopidae **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**29-45 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Grabend**
Lebensraum	**Savanne und Regenwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-25 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**90-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Direktentwicklung (keine Larven)**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**5-16**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**30-60 Tage**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Siphonops annulatus* ist nur wenig bekannt. Die Haltung beruht auf Erfahrungen mit landlebenden Blindwühlen ähnlicher Größe, die auf dieselbe Weise gehalten werden, u. a.
TEMPERATUR	Halte 22-25 °C am Tag und 21-23 °C in der Nacht. Die Temperatur muss stabil sein und höchstens um etwa 3 °C schwanken; schnelle und große Schwankungen werden schlecht vertragen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Der Bodengrund muss gleichmäßig feucht sein, aber nicht so nass, dass sich aus einer Handvoll Wasser pressen lässt, und am Boden der Box darf niemals Wasser stehen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Es soll kein Wassernapf vorhanden sein. Das Tier bekommt Wasser aus dem feuchten Bodengrund und aus Kondenswasser an den Wänden der Box, und ein Wassernapf macht den Bodengrund leicht zu nass.
LICHT UND UVB	Die Art lebt unter der Erde und braucht weder UVB noch besondere Beleuchtung. Ein normaler Tagesrhythmus im Raum mit 10-14 Stunden Licht reicht aus. Die Box darf nicht in direkter Sonne stehen.
FÜTTERUNG	Regenwürmer sind das Hauptfutter und werden von fast allen landlebenden Blindwühlen genommen. Verwende kleine bis mittelgroße Regenwürmer, z. B. Kompostwürmer, und schneide sie für Jungtiere in Stücke.
VERHALTEN UND UMGANG	*Siphonops annulatus* lebt versteckt und verbringt fast die ganze Zeit eingegraben.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/blindwuehlen/siphonops-annulatus