herpy

BLINDWÜHLEN

Boettger's Caecilian

Siphonops paulensis

Siphonops paulensis ist eine beinlose, grabende Blindwühle aus Brasilien, Paraguay, Bolivien und dem Norden Argentiniens. Sie lebt unter der Erde in offenem Gelände, Wald und Gärten, und das Weibchen bewacht seine wenigen Eier, aus denen direkt kleine Junge schlüpfen. Die Haut gibt ein Sekret ab, das rote Blutkörperchen auflöst.

Familie: Siphonopidae **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-35 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Grabend**
Lebensraum	**Savanne, Trockenwald und Regenwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Direktentwicklung (keine Larven)**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Saison	**4-6**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 30 × 35 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**90-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Siphonops paulensis* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	*Siphonops paulensis* wird bei 22-26 °C am Tag und 20-24 °C in der Nacht gehalten; die Angaben sind von *S. annulatus* übernommen, der ohne Heizung schlecht gedeiht.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Der Bodengrund muss gleichmäßig feucht sein, und die Luft in der Box ist nahezu gesättigt, 90-100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Die Art braucht keinen Wassernapf und keinen Wasserteil. Kondenswasser an den Wänden der Box genügt zum Trinken, und das Wasser dient nur dazu, den Bodengrund feucht zu halten.
LICHT UND UVB	Die Art lebt unter der Erde und braucht weder UVB noch sonstige Beleuchtung. Der normale Tag-Nacht-Rhythmus des Raumes mit 10-14 Stunden Licht genügt. Die Box darf nicht in direkter Sonne stehen.
FÜTTERUNG	Regenwürmer sind das Grundfutter und werden von fast allen landlebenden Blindwühlen genommen. Verwende Regenwürmer passender Größe, z. B. Kompostwürmer, und schneide sie für kleine Tiere in Stücke.
VERHALTEN UND UMGANG	*Siphonops paulensis* lebt versteckt unter der Erde, und ein gesundes Tier liegt die meiste Zeit eingegraben.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Paraguay, Bolivien und Argentinien.