herpy

BLINDWÜHLEN

Cayenne Caecilian

Typhlonectes compressicauda

Typhlonectes compressicauda ist eine vollständig wasserlebende, beinlose Blindwühle aus dem Amazonasgebiet und dem Guayana-Schild mit einem langen, dunklen und samtigen Körper und einem seitlich abgeflachten Rückensaum am Hinterende. Die Art bringt lebende Junge zur Welt und wird in einem warmen, weichen und gut gefilterten Aquarium mit einem schweren, dicht schließenden Deckel gehalten.

Familie: Typhlonectidae Früherer Name: *Typhlonectes cunhai* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**26-80 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-14 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber, in der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Aquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 45 × 45 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-30 °C**
Temperatur, Nacht	**24-30 °C**
Luftfeuchtigkeit	**100 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 30-35 cm
Wassertemperatur	**24-30 °C**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**In Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Entwicklung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**16 Monate**
Wurfgröße	**1-8 Jungtiere**
Tragzeit	**170-210 Tage**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Typhlonectes compressicauda* wird in einem Aquarium gehalten. Drei erwachsene Tiere brauchen mindestens 100 × 45 × 45 cm (etwa 200 Liter) mit einem großen Außenfilter.
TEMPERATUR	Die Wassertemperatur muss 24-30 °C betragen, und eine natürliche jahreszeitliche Schwankung innerhalb dieses Bereichs ist gut.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit spielt keine Rolle, denn das Tier lebt im Wasser. Die Luft unter einem dicht schließenden Deckel ist mit Feuchtigkeit gesättigt, deshalb stehen in der Tabelle 100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Blindwühlen nehmen Stoffe über die Haut auf, daher ist die Wasserqualität entscheidend. Der Filter muss eingefahren sein, bevor die Tiere einziehen.
LICHT UND UVB	Normale Aquarienbeleuchtung 12 Stunden am Tag genügt. Die Tiere bevorzugen Dunkelheit, daher muss es immer dunkle Verstecke geben.
FÜTTERUNG	*Typhlonectes compressicauda* frisst fast alles Fleischfutter: Regenwürmer, Grillen, Käferlarven, Garnelen und andere Krebstiere, Muscheln, Mückenlarven, aufgetaute Fische, neugeborene Mäuse und Fertigfutter für Lurche.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist friedlich und sammelt sich gern in Verstecken und auf Schwimmpflanzen, auch die Jungen um die Mutter.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Peru, Kolumbien, Französisch-Guayana und Guyana.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/blindwuehlen/typhlonectes-compressicauda