herpy

CHAMÄLEONS

## Teppichchamäleon

# *Furcifer lateralis*

*Furcifer lateralis* ist ein kleines, farbenprächtiges Chamäleon aus den Wäldern, dem Gestrüpp und den Gärten Madagaskars. Das Weibchen ist besonders stark gezeichnet, vor allem wenn es trächtig ist. Die Art wird nur 17-25 cm lang, reift in wenigen Monaten und lebt nur 2-3 Jahre, und ihre bescheidene Größe macht sie für den geübten Halter zu einem überschaubaren Chamäleon.

Familie: Chamaeleonidae  Englisch: Carpet Chameleon  Früherer Name: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni*

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **17-25 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Lebenserwartung | **2-3 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Baumbewohnend** |
| Lebensraum | **Savanne und Regenwald** |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **24-29 °C** |
| Sonnenplatz | **32-35 °C** |
| Temperatur, Nacht | **18-22 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **60-100 %** |
| UVB | **Notwendig**<br>Ferguson-Zone 3 |
| Ernährung | **Insekten** |
| Haltung | **Einzeln** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Geschlechtsreif | **3-6 Monate** |
| Gelegegröße | **6-23 Eier** |
| Gelege pro Jahr | **3-6** |
| Inkubation | **150-400 Tage**<br>bei 20-25 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| EU-Anhang | **Anhang B** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 45 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). |
| **TEMPERATUR** | Die Tagestemperatur soll 24-29 °C betragen. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | Die Luftfeuchtigkeit soll 60-100 % betragen. Das Terrarium darf im Laufe des Tages gern abtrocknen, solange die Luft relativ feucht ist und das Tier täglich trinken kann. |
| **LICHT UND UVB** | Die Art ist tagaktiv und sonnenliebend und braucht daher kräftiges Licht und UVB. Verwende eine T5-HO-Röhre mit 6500 K für das Licht und eine UVB-Röhre, die am Sonnenplatz Ferguson-Zone 3 ergibt. |
| **FÜTTERUNG** | *F. lateralis* ist reiner Insektenfresser. Die Beute soll etwa so lang sein wie der Abstand zwischen den Augen; Mehlwürmer dürfen länger sein. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | Die Art wird einzeln gehalten. Die Männchen sind aggressiv und territorial, und die Weibchen stressen leicht. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Madagaskar. |