herpy

CHAMÄLEONS

Böhme's Two-horned Chameleon

Kinyongia boehmei

Kinyongia boehmei ist ein kleines, grünes Bergchamäleon, das nur in den Taita Hills im Südosten Kenias vorkommt. Das Männchen trägt zwei flache, fast parallele Schnauzenhörner, das Weibchen hat keine Hörner. Die Art legt Eier und braucht ein kühles, feuchtes Klima und ein hohes, dicht bepflanztes Terrarium. Die Haltung ist kaum dokumentiert, und die Art eignet sich am besten für erfahrene Halter.

Familie: Chamaeleonidae Früherer Name: *Bradypodion tavetanum boehmei; Kinyongia tavetana boehmei*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-19 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**6-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Sonnenplatz	**28 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Gelegegröße	**2-11 Eier**
Inkubation	**180-360 Tage** bei 18-22 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Die Haltung von *Kinyongia boehmei* ist kaum dokumentiert, und mehrere der Zahlen hier sind anhand des Klimas der Taita Hills geschätzt.

TEMPERATUR
Tagsüber sollen es 22-26 °C sein, mit einem Sonnenplatz von etwa 28 °C, und die Temperatur darf nicht über 28 °C steigen. Nachts soll sie auf 15-20 °C sinken.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht 12-14 Stunden Licht am Tag, mit Vollspektrumlicht und UVB. Ferguson-Zone 2 ist eine Schätzung für ein Bergchamäleon.

FÜTTERUNG
Kinyongia boehmei frisst ausschließlich Insekten. Gute Futtertiere sind kleine Grillen, Heuschrecken, Stubenfliegen und Fruchtfliegen, ab und zu Mehlwürmer und Wachsmaden.

VERHALTEN UND UMGANG
Kinyongia boehmei ist territorial und wird durch Anfassen und durch den Anblick von Artgenossen gestresst. Die Männchen imponieren mit den Hörnern und mit Farbwechsel. Nimm das Tier nicht ohne Grund in die Hand.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Kenia.