herpy

CHAMÄLEONS

Usambara Three-Horned Chameleon

Trioceros deremensis

Trioceros deremensis ist ein großes, kräftig gebautes Chamäleon aus den Bergwäldern des östlichen Tansania. Das Männchen trägt drei lange, geringelte Hörner, während sie dem Weibchen völlig fehlen. Die Art ist ruhig gegenüber ihrem Halter, braucht aber kühle Temperaturen und sehr hohe Luftfeuchtigkeit, und die Zucht ist anspruchsvoll, sodass sie nur für sehr erfahrene Halter geeignet ist.

Familie: Chamaeleonidae Früherer Name: *Chamaeleo deremensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**120-150 g**
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**9-12 Monate**
Gelegegröße	**8-60 Eier**
Inkubation	**110-130 Tage** bei 22 °C

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier braucht ein Gitterterrarium von mindestens 60 × 60 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Die Art ist eine Bergart und bevorzugt mäßige bis kühle Temperaturen. Die Tagestemperatur muss 20-24 °C betragen und die Nachttemperatur 18-20 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss mindestens 80 % betragen und gern höher.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und braucht reichlich Licht. Verwende UVB-Leuchtstoffröhren und eine schwache Wärmelampe. Die UVB-Zone ist für die Art nicht gemessen.
FÜTTERUNG	*Trioceros deremensis* ist Insektenfresser und hat in der Regel großen Appetit. Gib abwechslungsreiche Kost wie Grillen, Fliegen, Heuschrecken und andere Futterinsekten passender Größe.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art wird einzeln gehalten und ist ruhig gegenüber ihrem Halter, aber aggressiv gegenüber Artgenossen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Tansania.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/chamaeleons/trioceros-deremensis