herpy

CHAMÄLEONS

Von Hoehnel's Chameleon

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii ist ein kleines, lebendgebärendes Chamäleon aus den kühlen Hochländern Kenias und Ugandas, wo die Nächte sich dem Gefrierpunkt nähern können. Das Männchen hat einen hohen Helm und ein Horn auf der Schnauze. Die Art ist robust gegen Kälte, verträgt aber Wärme schlecht, daher braucht sie ein kühles Terrarium mit einem deutlichen Temperaturabfall in der Nacht und hoher Nachtfeuchtigkeit.

Familie: Chamaeleonidae Früherer Name: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**15-70 g**
Lebenserwartung	**5-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-22 °C**
Sonnenplatz	**24-25 °C**
Temperatur, Nacht	**8-14 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-100 %**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Wurfgröße	**4-22 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Tragzeit	**120-180 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 45 × 90 cm (Länge × Breite × Höhe). Das Maß ist von ähnlichen kleinen Bergchamäleons der Gattung *Trioceros* übernommen und ein Minimum.

TEMPERATUR
Die Art stammt aus kühlem Hochland und verträgt Wärme schlecht. Die Tagestemperatur im Terrarium muss 20-22 °C betragen, mit einem Sonnenplatz von 24-25 °C. Jungtiere können sterben, wenn die Temperatur höher kommt.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Nacht ist die feuchte Zeit der Art. Die Luftfeuchtigkeit muss nachts gegen 100 % steigen, mit Nebel aus einem Ultraschallvernebler etwa drei Stunden spät in der Nacht und früh am Morgen.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und nutzt viel Licht. Gib das ganze Jahr 12 Stunden Licht am Tag. Eine T5-HO-Röhre mit 6500 K oder eine kräftige LED-Lampe über der Breite des Terrariums gibt das normale Licht. UVB ist nötig.

FÜTTERUNG
T. hoehnelii ist Insektenfresser und nimmt die meisten Insekten passender Größe.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art wird einzeln gehalten. Die Männchen sind gegeneinander und gegenüber ähnlichen Arten sehr aggressiv: Sie fauchen, blasen sich auf und werden schwarz, daher dürfen sich Männchen nicht sehen können.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Kenia und Uganda.