herpy

EIDECHSEN

Europäischer Fransenfinger

Acanthodactylus erythrurus

Acanthodactylus erythrurus ist eine schnelle, schlanke Eidechse aus Iberien und Nordwestafrika mit langen, gefransten Zehen, brauner und grauer Zeichnung und einem rötlichen Schwanz bei Jungtieren und Weibchen zur Paarungszeit. Die Art wird 18-23 cm lang, frisst Insekten und braucht tiefen Sandboden, kräftiges Sonnenlicht und hohe Wärme.

Familie: Lacertidae Englisch: Fringe-fingered Lizard

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-23 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-35 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**15-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Winterruhe	**10-15 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**10-18 Monate**
Gelegegröße	**1-8 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**35-60 Tage** bei 25-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Acanthodactylus erythrurus* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	*Acanthodactylus erythrurus* ist sehr wärmeliebend: Aktive erwachsene Tiere halten in der Natur eine Körpertemperatur von 32-38 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 30-50 % liegen, wie am trockenen, offenen Lebensraum. Der Sand soll trocken sein, und nur der Sand im Eiablagebehälter wird feucht gehalten, während das Terrarium im Übrigen gut belüftet bleibt.
LICHT UND UVB	*Acanthodactylus erythrurus* ist tagaktiv und sonnt sich viel, daher braucht das Terrarium kräftiges Licht und UVB.
FÜTTERUNG	*Acanthodactylus erythrurus* frisst Insekten und andere kleine Gliederfüßer, in der Natur vor allem Ameisen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Acanthodactylus erythrurus* ist schnell, wachsam und scheu. Bei Gefahr gräbt es sich in den Sand ein und ist schwer zu fassen. Vermeide es, das Tier zu greifen; der Schwanz wird bei Stress abgeworfen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Spanien, Portugal, Gibraltar, Marokko und Algerien.