herpy

EIDECHSEN

Asian Grass Lizard

Takydromus sexlineatus

Takydromus sexlineatus ist eine schlanke, tagaktive Eidechse mit einem ungewöhnlich langen Schwanz, die in hohem Gras und niedrigem Bewuchs in Südostasien lebt. Sie wird 20-30 cm lang, wovon der größte Teil auf den Schwanz entfällt, und frisst kleine Insekten. Die Art ist tropisch und braucht keine Winterruhe, trocknet aber schnell aus und verlangt ein hohes, dicht bepflanztes Terrarium mit mäßiger Feuchtigkeit.

Familie: Lacertidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-30 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-7 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**34-40 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-4 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-5**
Inkubation	**40 Tage** bei 26 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein kleines Glasterrarium ist für *Takydromus sexlineatus* zu wenig, auch wenn das Tier klein ist. Ein Paar braucht mindestens 60 × 40 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), ein Männchen mit zwei Weibchen mindestens 90 × 60 × 60 cm.
TEMPERATUR	Der Gradient ist das Wichtigste. Die Tagestemperatur beträgt 25-30 °C, und am Sonnenplatz liegt die Oberflächentemperatur bei 34-40 °C, gemessen mit einem Infrarotthermometer.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss 60-70 % betragen. Besprühe das Terrarium zweimal täglich mit Wasser, damit die Tiere Tropfen von den Blättern und Wänden trinken können und die Luftfeuchtigkeit oben bleibt.
LICHT UND UVB	*Takydromus sexlineatus* ist tagaktiv. Das Terrarium braucht einen kleinen Wärmespot und UVB-Licht.
FÜTTERUNG	*Takydromus sexlineatus* ist ein Insektenfresser und nimmt kleine lebende Insekten. Als Futter eignen sich kleine Grillen, Fliegen, Drosophila, Springschwänze, Mehlwürmer, Wachsmottenlarven, kleine Heuschrecken und kleine Schaben.
VERHALTEN UND UMGANG	*Takydromus sexlineatus* ist schnell, scheu und ein Tier zum Beobachten.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indien, China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia und Indonesien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/eidechsen/takydromus-sexlineatus