herpy

FRÖSCHE

Vierstreifen-Ruderfrosch

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax ist ein schlanker, nachtaktiver Baumfrosch von 4-9 cm aus Südostasien, der seine Eier in einem Schaumnest am Wasser ablegt. Er ist anpassungsfähig, lebt gern in der Nähe des Menschen und ist leicht zu halten, verträgt aber keine Wärme über 29 °C. Die Fortpflanzung wird in einer Regenkammer in Gang gesetzt.

Familie: Rhacophoridae Englisch: Four-lined Tree Frog Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**4-9 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald, Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Schaumnest**
Eier pro Gelege	**100-400**
Schlupf	**3-4 Tage**
Larvenzeit	**49-70 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Zwei erwachsene *P. leucomystax* können in einem Glasterrarium von 45 × 45 × 60 cm gehalten werden, das für 2-4 Tiere reicht.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 23-27 °C und nachts bei 18-22 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Halte die Luftfeuchtigkeit bei 60-70 %. Das gelingt mit Handsprüher, Nebelanlage oder Regenanlage, je nach Bedarf mehrmals täglich.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	*P. leucomystax* muss stets Zugang zu sauberem Wasser in einer großen, flachen Schale haben, die leicht zu reinigen ist und aus der der Frosch leicht hinaufkommt.
LICHT UND UVB	Die Art braucht kein anderes Licht als das, was die Pflanzen verlangen. Es gibt keine Belege dafür, dass sie UVB braucht, aber eine schwache UVB-Quelle kann für die Pflanzen verwendet werden und wirkt außerdem bakterienhemmend.
FÜTTERUNG	*P. leucomystax* ist Insektenfresser, und Heimchen können das Basisfutter sein, ergänzt mehrmals im Monat mit Wachsmottenlarven, Seidenraupen, Motten, Fliegen, kleinen Regenwürmern und kleinen Schaben.
VERHALTEN UND UMGANG	*P. leucomystax* ist nachtaktiv und sitzt tagsüber versteckt zwischen Pflanzen und Ästen, schnappt sich aber gern ein vorbeikommendes Futtertier.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand.