herpy

FRÖSCHE

Black-eyed Leaf Frog

Agalychnis moreletii

Agalychnis moreletii ist ein 6-9 cm großer Laubfrosch aus den Bergwäldern Mexikos und Mittelamerikas: auf dem Rücken grün, mit tiefschwarzen Augen und orangen Flanken und Schenkeln. Sie ist nachtaktiv und lebt hoch oben in den Bäumen. Sie verlangt kühlere und trockenere Bedingungen als die meisten Verwandten: Tagsüber muss das Terrarium trocken sein und unter 24 °C liegen, und erst am Abend wird es feucht besprüht.

Familie: Phyllomedusidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-9 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**6-25 g**
Lebenserwartung	**5-11 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Sonnenplatz	**25 °C**
Temperatur, Nacht	**15-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-70 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 2-3 cm
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Eier pro Gelege	**23-334**
Schlupf	**7-11 Tage** bei 20-24 °C
Larvenzeit	**60-100 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Agalychnis moreletii lebt in den Bäumen, daher ist die Höhe wichtiger als die Grundfläche. Ein Terrarium von mindestens 45 × 45 × 60 cm bietet Platz für eine kleine Gruppe von vier Tieren.

TEMPERATUR

Agalychnis moreletii ist eine Gebirgsart und muss kühler gehalten werden als die bekanntere *Agalychnis callidryas*. Tagsüber sollen es 20-24 °C sein.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN

Trockene Luft am Tag ist für *Agalychnis moreletii* entscheidend. Die Luftfeuchtigkeit wird tagsüber, während die Frösche schlafen, bei 50-70 % gehalten, außerhalb der Fortpflanzungszeit gern bei etwa 60 %.

WASSER UND WASSERQUALITÄT

Im Terrarium muss immer eine Schale mit sauberem Wasser stehen. Eine Schale von etwa 20 cm Durchmesser mit 2-3 cm Wasser genügt, und die Frösche müssen leicht wieder herauskommen.

LICHT UND UVB

UVB wird empfohlen, weil Vitamin D für den Kalkstoffwechsel notwendig ist und Insekten fast keines enthalten.

FÜTTERUNG

Agalychnis moreletii frisst nur Insekten. Heimchen (*Acheta domesticus*) sind das beste Grundfutter, wenn sie 48 Stunden lang mit nährstoffreichem Futter, z. B.

VERHALTEN UND UMGANG

Agalychnis moreletii schläft tagsüber auf Blättern und ist nachts aktiv. Sie bewegt sich langsam und klettert Hand über Hand, springt aber weit, wenn sie erschreckt wird, daher öffne das Terrarium vorsichtig.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras und El Salvador.