herpy

FRÖSCHE

Gelbbauchunke

Bombina variegata

Bombina variegata ist ein kleiner, kompakter Frosch von 3-6 cm mit graubraunem, spitzwarzigem Rücken und einem grellgelben und blaugrauen Bauch, den er zeigt, wenn er sich bedroht fühlt. Die Art lebt im Berg- und Hügelland Mittel- und Südeuropas, mag kleine, sonnenwarme Wasserstellen und ist im Terrarium robust, neugierig und langlebig. Sie braucht kühle Temperaturen und eine kühle Winterruhe, aber ansonsten nur wenig Platz.

Familie: Bombinatoridae Englisch: Yellow-bellied Toad **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-6 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**2,3-12 g**
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 5-10 cm
UVB	**Optional**
Winterruhe	**5-10 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Eier pro Gelege	**40-170**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Schlupf	**2-3 Tage**
Larvenzeit	**25-70 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Es gibt nicht viele detaillierte Pflegebeschreibungen von *Bombina variegata*.
TEMPERATUR	Die Art ist an ein gemäßigtes Klima angepasst und braucht keine Wärme wie die meisten Terrarientiere. Tagsüber sind 20-24 °C passend, und nachts soll es etwas kühler sein, 16-20 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen. Der große Wasserteil hält den Großteil der Feuchtigkeit, daher genügt es normalerweise, den Landteil einmal täglich leicht zu besprühen, besonders in einer trockenen Wohnung im Winter.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil soll etwa die Hälfte der Bodenfläche einnehmen und 5-10 cm tief sein. Die Tiere liegen gern an der Oberfläche oder auf schwimmenden Pflanzen und müssen leicht an Land gelangen können, z.
LICHT UND UVB	Gib im Sommer 12-14 Stunden Licht und im Winter bis zu etwa 10 Stunden herunter, gesteuert von einer Zeitschaltuhr. Eine LED-Leuchte gibt das Grundlicht und lässt die Pflanzen gedeihen. Eine Wärmelampe ist nicht nötig.
FÜTTERUNG	*B. variegata* hat großen Appetit und nimmt alles Lebende, das klein genug ist, um ins Maul zu passen: Heimchen, Grillen, Fruchtfliegen, Fliegen, Asseln, Silberfischchen, kleine Regenwürmer und kleine Schnecken.
VERHALTEN UND UMGANG	*B. variegata* ist neugierig und gesellig und kann paarweise oder in Gruppen gehalten werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Italien, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Rumänien, Republik Moldau, Ukraine, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien und Griechenland.