herpy

FRÖSCHE

Amazonas-Hornfrosch

Ceratophrys cornuta

Ceratophrys cornuta ist ein kräftiger, breitmäuliger Frosch aus dem Regenwald des Amazonas und der Guayana-Region, der im Laub eingegraben liegt, nur Augen und Hörner sichtbar, und zuschlägt, wenn etwas Fressbares vorbeikommt. Die Weibchen werden bis zu 15 cm groß, und das Maul kann Beute nehmen, die fast so groß ist wie sie selbst. Als Regenwaldart braucht sie mehr Feuchtigkeit als die Verwandten aus den trockenen Ebenen weiter im Süden.

Familie: Ceratophryidae Englisch: Amazonian Horned Frog

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-15 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Temperatur, Nacht	**23-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**75-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**36-48 Monate**
Eier pro Gelege	**300-1.000**
Schlupf	**3-25 Tage**
Larvenzeit	**28-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Über die Pflege von *Ceratophrys cornuta* gibt es verhältnismäßig wenig Wissen, weil die Art viel seltener nachgezüchtet wird als *Ceratophrys cranwelli* und *Ceratophrys ornata*.

TEMPERATUR
Tagsüber wird das Terrarium bei 25-28 °C und nachts bei 23-25 °C gehalten. Die Werte sind von den übrigen Arten der Gattung übernommen und liegen am warmen Ende, weil *C. cornuta* aus warmem Regenwald stammt.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit wird das ganze Jahr über bei 75-90 % gehalten, höher als bei den verwandten Arten aus Pampa und Chaco, weil die Art aus dem Regenwald stammt.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Gib immer eine flache Schale mit frischem, aufbereitetem Wasser, groß genug, dass der ganze Frosch darin liegen kann, aber mit einem Wasserstand höchstens bis zum Maul des Frosches.

LICHT UND UVB
UVB ist nicht nötig, aber eine schwache UVB-Röhre (Ferguson-Zone 1) kann von Nutzen sein. Hänge sie über eine Seite, sodass im Rest immer Schatten ist, und verzichte auf UVB bei Albinotieren, die lichtempfindlich sind.

FÜTTERUNG
Die Art frisst fast alles, was ins Maul passt. In der Natur frisst sie Frösche, Fische, Eidechsen, Mäuse und andere Wirbeltiere sowie große Insekten.

VERHALTEN UND UMGANG
Ceratophrys cornuta ist ein sitzender Frosch, der die meiste Zeit eingegraben liegt und nur zum Fressen hervorkommt. Ausgewachsene Tiere sind aggressiv und können nach einer Hand springen, die zu nahe kommt, und der Biss tut weh.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien, Venezuela, Guyana, Suriname und Französisch-Guayana.