herpy

FRÖSCHE

## Chaco Horned Frog

# *Chacophrys pierottii*

*Chacophrys pierottii* ist ein kleiner, runder Hornfrosch aus Trockenwald und Buschland im Gran Chaco in Südamerika. Er wird 5-7 cm lang, gräbt sich in lockere Erde ein und verbringt die Trockenzeit in einem Kokon aus abgestoßener Haut. Die Art muss einzeln gehalten werden, frisst überwiegend Insekten und ist in Terrarien selten zu sehen, daher gibt es nur wenig Wissen über die Haltung.

Familie: Ceratophryidae

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **5-7 cm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **3-5 Jahre** |
| Aktiv | **In der Dämmerung und nachts** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend und grabend** |
| Lebensraum | **Savanne und Trockenwald** |
| Hautgift | **Keins bekannt** |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **45 × 30 × 25 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **24-28 °C** |
| Temperatur, Nacht | **22-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **50-70 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Optional**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Insekten und Würmer/Schnecken** |
| Haltung | **Einzeln** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen im Wasser** |
| Eiablage | **Im Wasser** |
| Eier pro Gelege | **900-2.000** |
| Larvenzeit | **14 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Algen/Pflanzen und Fertigfutter** |
| Brutpflege | **Keine** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Über die Haltung von *Chacophrys pierottii* gibt es nur wenig Wissen. Die Empfehlungen hier sind von *Ceratophrys cranwelli* übernommen, die im selben Gebiet lebt und denselben Körperbau und dieselbe Lebensweise hat. |
| **TEMPERATUR** | Tagsüber wird das Terrarium bei 24-28 °C gehalten und nachts bei 22-24 °C, passend zur warmen, regenreichen Zeit, in der der Frosch aktiv ist. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit wird bei 50-70 % gehalten. Das Substrat soll durchgehend leicht feucht sein. Sprühe jeden Abend, sodass die obersten Zentimeter feucht werden, ohne im Wasser zu stehen. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Biete eine flache, breite Wasserschale an, in der der Frosch sitzen kann, ohne schwimmen zu müssen, und aus der er leicht wieder herauskommt; er nimmt Wasser über die Haut auf. |
| **LICHT UND UVB** | UVB ist für *Chacophrys pierottii* nicht nötig, aber eine schwache UVB-Röhre (Ferguson-Zone 1) sorgt für einen deutlichen Tagesrhythmus und schadet nicht, solange sich der Frosch eingraben kann. Die Nacht muss dunkel sein. |
| **FÜTTERUNG** | Erwachsene Tiere fressen in der Natur überwiegend Insekten wie Käfer, Bienen, Ameisen und Schmetterlingsraupen und gelegentlich andere Frösche. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Chacophrys pierottii* ist ein Einzelgänger, der lange still eingegraben liegt und zuschlägt, wenn die Beute vorbeikommt. Sie ist nachts am aktivsten. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Argentinien, Bolivien und Paraguay. |