herpy

FRÖSCHE

Tomatenfrosch

Dyscophus antongilii

Dyscophus antongilii ist ein Frosch aus dem nordöstlichen Tiefland Madagaskars: rund, kräftig und einheitlich orange bis tiefrot. Das Weibchen wird bis zu 11 cm groß und wiegt über 200 g, das Männchen ist kleiner und gedeckter gefärbt. Er liegt tagsüber eingegraben und jagt nachts, und er ist ruhig und robust zu halten, wenn Temperatur, Feuchtigkeit und Hygiene stimmen.

Familie: Microhylidae Englisch: Tomato Frog **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-11 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**40-230 g**
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**9-24 Monate**
Eier pro Gelege	**1.000-1.500**
Schlupf	**1-2 Tage**
Larvenzeit	**45 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder drei Tiere brauchen ein Terrarium von mindestens 60 × 35 × 35 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Bodenfläche ist wichtiger als die Höhe, denn *D. antongilii* lebt am Boden und gräbt.
TEMPERATUR	*Dyscophus antongilii* verträgt eine breite Temperaturspanne und gedeiht bei normaler Zimmertemperatur. Tagsüber sollen es 23-27 °C und nachts 18-21 °C sein.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen. Besprühe leicht einmal täglich oder jeden zweiten bis dritten Tag, je nachdem, wie schnell das Terrarium austrocknet, und verwende ein Hygrometer.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Stelle eine Wasserschale mit entchlortem Wasser hin, so groß, dass der Frosch darin sitzen kann, und mindestens so tief, wie der Frosch hoch ist.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und braucht kein UVB, aber ein schwaches UVB-Licht (etwa Ferguson-Zone 1) schadet nicht und kann gegeben werden. Für lebende Pflanzen wird eine Tageslichtröhre wie für Aquarien verwendet.
FÜTTERUNG	*Dyscophus antongilii* frisst nur lebendes Futter.
VERHALTEN UND UMGANG	*Dyscophus antongilii* ist ruhig und verborgen. Er liegt den größten Teil des Tages eingegraben und kommt nachts hervor.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.