herpy

FRÖSCHE

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

Ein kleiner, kompakter Frosch mit großen Augen und grauschwarzem Rücken mit braunen Längsbändern. Er lebt in Savannen und Feuchtgebieten in weiten Teilen Afrikas südlich der Sahara. *Kassina senegalensis* geht und läuft lieber, als dass er hüpft, ist in der Dämmerung und nachts aktiv und bekannt für seinen explosiven, blubbernden Ruf.

Familie: Hyperoliidae Früherer Name: *Cystignathus senegalensis* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-80 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 5 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Eier pro Gelege	**100-600**
Schlupf	**5-6 Tage**
Larvenzeit	**50-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Über die Haltung von *Kassina senegalensis* ist nur wenig direkt bekannt. Die Art gilt jedoch als leicht zu halten, und die Empfehlungen hier stützen sich auf den Lebensraum und auf die nah verwandte *Phlyctimantis maculatus*.

TEMPERATUR
Tagsüber soll die Temperatur 24-27 °C betragen und nachts 20-23 °C. Die Temperatur darf nicht über 30 °C steigen, denn die Art wird in der Hitze gestresst und inaktiv.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit soll bei 50-80 % liegen, am niedrigsten tagsüber (etwa 50-70 %) und höher nachts (etwa 70-80 %). Die Zahlen sind von der verwandten *Phlyctimantis maculatus* übernommen.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Stelle eine Schale oder einen kleinen Wasserteil von mindestens 5 cm Tiefe ins Terrarium und halte ihn immer sauber. Das Wasser darf höchstens etwa ein Viertel der Bodenfläche einnehmen.

LICHT UND UVB
Die Art ist ab der Dämmerung und nachts aktiv, lebt aber in offenen, hellen Landschaften, und ein helles Terrarium mit Leuchtröhren oder LED von 5.000-6.500 K über die ganze Länge des Terrariums ist ein guter Ausgangspunkt.

FÜTTERUNG
Die Art ist ein vielseitiger Jäger, der Insekten und andere Gliedertiere von Kopfgröße oder kleiner nimmt.

VERHALTEN UND UMGANG
Kassina senegalensis ist dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber sitzen die Tiere oder graben sich im Versteck ein, und nachts gehen sie auf die Jagd, laufen am Boden und rufen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Senegal, Gambia, Guinea, Côte d'Ivoire, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo-Brazzaville, Sudan, Südsudan, Äthiopien, Somalia, Uganda, Ruanda, Kenia, Tansania, Angola, Sambia, Malawi, Mosambik, Simbabwe, Namibia, Botsuana, Südafrika, Eswatini und Lesotho.