herpy

FRÖSCHE

Climbing Mantella

Mantella laevigata

Mantella laevigata ist ein kleiner, tagaktiver Frosch aus den Regenwäldern im Nordosten Madagaskars und der einzige in der Gattung, der klettert. Er ist schwarz mit gelbem bis hellgrünem Rücken und blauen Flecken an den Gliedmaßen, wird 2-3 cm groß und brütet in wassergefüllten Bambusröhren und Baumhöhlen, wo das Weibchen die Kaulquappe mit unbefruchteten Eiern füttert. Er braucht ein hohes, feuchtes und mäßig warmes Terrarium mit vielen Ästen.

Familie: Mantellidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**2-3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**1,2-2 g**
Lebenserwartung	**4-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 50 × 100 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-26 °C**
Temperatur, Nacht	**17-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**1-3**
Schlupf	**2-7 Tage**
Larvenzeit	**90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen, unbefruchtete Eier des Weibchens und andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Mantella laevigata klettert, daher muss das Terrarium hoch und senkrecht eingerichtet sein. Das Mindestmaß für eine Gruppe von vier erwachsenen Tieren ist 60 × 50 × 100 cm (Länge × Breite × Höhe).

TEMPERATUR

Tagsüber sollen es 20-26 °C sein, und nachts fällt die Temperatur um 2-4 Grad auf 17-22 °C. Die Tagestemperatur darf gern 27 °C erreichen, und für kürzere Zeit verträgt die Art bis zu 30 °C und bis hinunter zu 17-18 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN

Die Luftfeuchtigkeit soll 80-100 % betragen. Besprühe das Terrarium täglich mit entchlortem Wasser oder Regenwasser, besonders in der Zeit, in der die Art sich fortpflanzen soll.

WASSER UND WASSERQUALITÄT

Stelle eine oder mehrere niedrige Wasserschalen im Terrarium auf und halte sie immer gefüllt. Die Tiefe beträgt 1-2 cm, sodass die Tiere leicht herauskommen.

LICHT UND UVB

Das Licht muss zu den Pflanzen passen, darf das Terrarium aber nicht aufheizen. Sorge für 10-12 Stunden Tageslicht und Dunkelheit in der Nacht.

FÜTTERUNG

Das Hauptfutter sind kleine Gliederfüßer: Springschwänze, Fruchtfliegen, frisch geschlüpfte Grillen, Termiten und kleine Ameisen. Jungtiere bekommen Springschwänze.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Männchen sind verhältnismäßig kühn und rufen offen, um ihr Revier zu verteidigen, während die Weibchen zurückgezogener sind. Die Männchen kämpfen um Reviere mit Ringen, Jagen und Springen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Madagaskar.