herpy

FRÖSCHE

## Madagascan Mantella

# *Mantella madagascariensis*

*Mantella madagascariensis* ist ein kleiner, tagaktiver Frosch aus den Regenwäldern des ost-zentralen Madagaskars: schwarz mit rotorangefarbenen, schwarz gefleckten Hinterbeinen, hellgrünen Flecken an den Vorderbeinen und einer himmelblauen, hufeisenförmigen Zeichnung an der Kehle. Er wird nur 21-25 mm groß, ernährt sich von Ameisen und anderen kleinen Gliederfüßern und braucht ein kühles, feuchtes Terrarium. Die Art ist in der Natur gefährdet, wähle daher am liebsten Nachzuchten.

Familie: Mantellidae

### STECKBRIEF

#### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **21-25 mm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **4-8 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald und Bergwald** |
| Hautgift in der Natur | **Schwach** |
| Hautgift in Menschenobhut | **Keins**<br>Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

#### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **60 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H für 4 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **20-23 °C** |
| Temperatur, Nacht | **16-18 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **70-100 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Optional**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **In Gruppen** |

#### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen im Wasser** |
| Eiablage | **Am Boden** |
| Geschlechtsreif | **12-18 Monate** |
| Eier pro Gelege | **12-30** |
| Schlupf | **3-12 Tage** |
| Larvenzeit | **56-112 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Algen/Pflanzen und Fertigfutter** |
| Brutpflege | **Keine** |

#### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| IUCN | **Gefährdet (VU)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Ein niedriges, flaches Terrarium von mindestens 60 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe) fasst eine Gruppe von vier erwachsenen Tieren. Der Frosch lebt am Boden, daher ist die Grundfläche wichtiger als die Höhe. |
| **TEMPERATUR** | *Mantella madagascariensis* gedeiht kühl. Tagsüber sollen es 20-23 °C sein, und nachts darf die Temperatur auf 16-18 °C fallen. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit soll die meiste Zeit hoch sein, 70-100 %, besonders wenn es warm ist. Sprühe das Terrarium jeden Tag mit entchlortem Wasser, kräftig bei warmem Wetter und etwas weniger, wenn es kalt ist. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Stelle eine flache Wasserschale ins Terrarium und lass sie immer gefüllt. Die Frösche sind schlechte Schwimmer, daher muss die Schale so flach sein, dass sie leicht hinaufkommen, und sie darf nicht viel vom Boden einnehmen. |
| **LICHT UND UVB** | Ein UVB-Bedarf ist bei der Art nicht dokumentiert, und die Frösche kommen ohne zurecht. |
| **FÜTTERUNG** | Der Frosch ist ein eifriger Jäger und kann im Verhältnis zu seiner Größe recht große Beutetiere fressen. In der Natur ernährt er sich hauptsächlich von Ameisen und Milben. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Mantella madagascariensis* ist tagaktiv und kann dabei beobachtet werden, wie sie in ihrem Gebiet patrouilliert und fast den ganzen Tag Futter jagt. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Madagaskar. |