herpy

FRÖSCHE

Green Mantella

Mantella viridis

Mantella viridis ist ein kleiner, tagaktiver Frosch von 2-3 cm mit leuchtend grüner Farbe, schwarzer Gesichtsmaske und blau-weiß marmoriertem Bauch. Er lebt nur im äußersten Norden Madagaskars, verträgt Wärme schlecht und ist in der Natur bedroht, daher kommen nur Nachzuchten infrage.

Familie: Mantellidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**2-3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**17-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**In Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**40-115**
Larvenzeit	**42-56 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Die Einrichtung kann einfach sein. Die Grundfläche ist wichtiger als die Höhe, weil *M. viridis* fast nur am Boden lebt. Ein Terrarium von 45 × 45 × 30 cm reicht für vier Tiere, und ein breiteres, z.
TEMPERATUR	Tagsüber wird das Terrarium auf 20-24 °C gehalten, mit einem Abfall auf 17-20 °C nachts. Über 27 °C gerät *M. viridis* schnell in Stress, und in der Gattung können Temperaturen über 27 °C schnell tödlich werden, besonders für Jungtiere.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit wird im Alltag bei 60-70 % und in der Fortpflanzungszeit bei bis zu 80 % gehalten, mit mehr Feuchtigkeit unten am Boden und im Moos.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Es soll immer eine flache Wasserschale oder ein flacher Wasserbereich vorhanden sein, damit die Frösche bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit nicht austrocknen.
LICHT UND UVB	Licht ist in erster Linie für die Pflanzen da. Es gibt keinen Beleg dafür, dass *M. viridis* UVB braucht, aber weil die Art in der Natur in teilweiser Sonne aktiv ist, ist eine schwache UVB-Röhre vermutlich von Vorteil.
FÜTTERUNG	*M. viridis* ist ein kleiner Insektenfresser, der kleine Beutetiere nimmt.
VERHALTEN UND UMGANG	*M. viridis* ist tagaktiv und am besten in einer Gruppe aufgehoben. Außerhalb der Fortpflanzungszeit sind die Tiere untereinander so gut wie passiv, aber erwachsene Weibchen können in der Fortpflanzungszeit raufen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.