herpy

FRÖSCHE

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio ist ein großer, grasgrüner Flugfrosch aus den Regenwäldern im Süden Chinas, in Laos, Thailand und Vietnam. Die Weibchen werden bis zu 8 cm groß. Die Schwimmhaut ist orangegelb mit einem schwarzen Fleck an der Wurzel jedes Fingers und jeder Zehe, und der Frosch spannt sie auf, wenn er zwischen den Bäumen gleitet. Die Art ist nachtaktiv und scheu, und über die Haltung in menschlicher Obhut ist nur wenig bekannt.

Familie: Rhacophoridae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-8 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-24 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 2-3 cm
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Schaumnest**
Eier pro Gelege	**130-180**
Schlupf	**5 Tage**
Larvenzeit	**45-85 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Rhacophorus kio* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-24 °C, also normaler Zimmertemperatur, und lass es nachts gern auf 18-21 °C sinken. Kurze Phasen bis 27-28 °C verträgt der Frosch, aber die Temperatur darf nicht über 28 °C steigen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 70-90 % liegen, am niedrigsten tagsüber und am höchsten nachts.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Stelle eine stabile, flache Wasserschale ins Terrarium, in der der Frosch nachts sitzen kann. 2-3 cm Wasser genügen, sodass der Frosch leicht wieder herauskommt.
LICHT UND UVB	Der Frosch lebt auf Bäumen, und eine schwache UVB-Quelle der Art, die für tropische Waldtiere verwendet wird, wird empfohlen. Ein niedriger UV-Index auf den obersten Blättern (Ferguson-Zone 1) ist ein vorsichtiger Ausgangspunkt.
FÜTTERUNG	*Rhacophorus kio* frisst lebende Insekten.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist nachtaktiv und scheu und verbringt den Tag versteckt zwischen den Blättern; die meiste Zeit sitzt sie am Glas oder an der Einrichtung.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China, Laos, Thailand und Vietnam.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/froesche/rhacophorus-kio