herpy

FRÖSCHE

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum ist ein kleiner, nachtaktiver Laubfrosch aus den Wäldern Südostasiens. Er ist schwarzbraun mit weißen Warzen, die Vogelkot ähneln, und hat tief rubinrote Augen. Die Art verträgt mehr Wärme als die übrigen Gattungsverwandten und gedeiht in einem kleinen, feuchten Terrarium mit Wasserteil. Sie ruft recht kräftig und wird am besten in einer kleinen Gruppe gehalten.

Familie: Rhacophoridae Früherer Name: *Philautus asper*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**17-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**75-95 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 5-10 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Geschlechtsreif	**6-10 Monate**
Eier pro Gelege	**4-15**
Schlupf	**7-14 Tage**
Larvenzeit	**75-180 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Theloderma asperum* ist klein und kann in einem verhältnismäßig kompakten Terrarium gehalten werden. Ein Terrarium von 45 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe) passt für eine kleine Gruppe von vier Tieren.
TEMPERATUR	Tagsüber soll die Temperatur 20-24 °C und nachts 17-21 °C betragen. Die Art verträgt kurzzeitig bis hinunter auf etwa 10 °C und kommt mit 24-25 °C ohne Probleme zurecht, aber über 27 °C wird es gefährlich und kann tödlich sein.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit wird bei 75-95 % gehalten. Die Art verträgt kurze Phasen bis hinunter auf etwa 50 %, wenn Zugang zu Wasser besteht, aber trockene Luft ohne Wasser kann schnell tödlich sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Frosch hält sich viel am Wasserrand auf und sitzt sogar unter Wasser, daher ist der Wasserteil keine Dekoration.
LICHT UND UVB	Der Frosch ist nachtaktiv und hat keinen dokumentierten Bedarf an UVB.
FÜTTERUNG	*T. asperum* frisst Insekten. Kleine Grillen sind das wichtigste Futter, ergänzt durch Wachsmottenlarven, Fliegen, Springschwänze für die kleinsten Jungtiere, kleine Dubia-Schaben und Soldatenfliegenlarven.
VERHALTEN UND UMGANG	*Theloderma asperum* ist nachtaktiv und sitzt tagsüber versteckt in Röhren, zwischen Pflanzen oder nahe am Wasser.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Malaysia, Thailand, Myanmar, Indien, Bangladesch, Bhutan, Vietnam, Kambodscha und Indonesien.