herpy

FRÖSCHE

Vietnamesischer Moosfrosch

Theloderma corticale

Theloderma corticale ist ein nachtaktiver, halb im Wasser lebender Frosch aus den Wäldern Nordvietnams, von Laos und Südchina. Die höckerige, grün-schwarz gefleckte Haut gleicht Moos und Flechten so gut, dass der Frosch im Terrarium fast verschwindet. Er braucht es kühl und nass und verträgt keine Wärme, lässt sich dafür aber leicht nachziehen.

Familie: Rhacophoridae Englisch: Tonkin Bug-eyed Frog Früherer Name: *Rhacophorus corticalis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-9 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Regenwald, Bergwald und Felsgelände**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-23 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 5-10 cm
Wassertemperatur	**17-22 °C**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Winterruhe	**13-16 °C** 4-22 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Geschlechtsreif	**8-10 Monate**
Eier pro Gelege	**6-47**
Schlupf	**9-22 Tage**
Larvenzeit	**75-180 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Theloderma corticale* braucht ein Aquaterrarium, in dem ein großer Teil des Bodens oder der ganze Boden unter Wasser steht.
TEMPERATUR	Wärme ist der größte Feind der Art. Tagsüber sollen es 18-23 °C sein und nachts 15-20 °C. Bis hinunter auf etwa 10 °C ist in Ordnung, während alles über 25 °C ein Warnsignal ist und Temperaturen über 27 °C die Frösche töten können.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein: über 80 % und nie unter 60 %, sonst können die Frösche austrocknen. Die Weibchen legen bei 80-90 % Eier.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserteil ist das Zuhause der Art. Das Wasser sollte 5-10 cm tief sein, tieferes Wasser geht aber auch. Die Frösche müssen im Wasser sitzen und leicht auf Kork oder Wurzeln hinaufkommen können.
LICHT UND UVB	Der Frosch ist nachtaktiv und hat keinen dokumentierten Bedarf an UVB.
FÜTTERUNG	*T. corticale* frisst Insekten: gut gefütterte Grillen, Dubia-Schaben, Wachsmottenlarven, Soldatenfliegenlarven und kleine Hornwürmer.
VERHALTEN UND UMGANG	*Theloderma corticale* ist ruhig und versteckt sich tagsüber in Röhren, Höhlen und zwischen Pflanzen. Wenige Minuten nach dem Ausschalten des Lichts wird sie aktiv.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vietnam, Laos und China.