herpy

FRÖSCHE

Amazonas-Milchfrosch

Trachycephalus resinifictrix

Trachycephalus resinifictrix ist ein großer, kräftiger, nachtaktiver Laubfrosch aus den Baumkronen des Amazonasgebiets. Die Jungtiere sind schwarz-weiß gestreift, die erwachsenen Tiere marmoriert, und bei Bedrohung sondert der Frosch ein milchig weißes Hautsekret ab. Er legt seine Eier in wassergefüllten Baumhöhlen ab, ist in der Haltung robust und ähnelt in vielem *Ranoidea caerulea*.

Familie: Hylidae Englisch: Amazon Milk Frog Früherer Name: *Phrynohyas resinifictrix* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-10 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**75 × 30 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-29 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-100 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**12-18 Monate**
Eier pro Gelege	**100-1.500**
Schlupf	**1-2 Tage**
Larvenzeit	**21-75 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Paar braucht ein Terrarium von mindestens 75 × 30 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe), und das reicht für bis zu vier erwachsene Tiere. Eine Gruppe von fünf Tieren braucht mindestens 60 × 45 × 60 cm.
TEMPERATUR	*Trachycephalus resinifictrix* verträgt eine breite Temperaturspanne.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit ist weniger kritisch als die Temperatur, aber das Terrarium sollte mindestens einmal täglich besprüht werden.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	*Trachycephalus resinifictrix* braucht eine große Schale mit sauberem Wasser, die der Baumhöhle in der Natur entspricht.
LICHT UND UVB	*Trachycephalus resinifictrix* ist nachtaktiv und kann ohne UVB leben und sich fortpflanzen, aber Jungtiere, die mit UVB aufwachsen, werden größer und bekommen ein gesünderes Skelett als Jungtiere ohne.
FÜTTERUNG	*T. resinifictrix* ist gefräßig und selten wählerisch. Heimchen können den Hauptteil der Nahrung ausmachen, und sie sollten etwa so lang sein, wie der Kopf des Frosches breit ist.
VERHALTEN UND UMGANG	*T. resinifictrix* ist kein Tier zum Anfassen. Die Haut ist durchlässig und empfindlich gegenüber Öl und Salzen von der menschlichen Haut, und das Hautsekret kann reizen. Nimm den Frosch nur heraus, wenn es nötig ist, z.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Französisch-Guayana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Peru und Ecuador.